

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. C. G. C. 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

Syngenta Crop Protection AG
Suiza

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 7710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 0.5 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

190.00 mm

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, fumar, ni aplicar el producto.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto címbrese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el empaque y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar el contacto con los ojos, nariz, boca, uñas, heridas, abrasiones, quemaduras, medicamentos, heridas, ni forajidos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental: lavar la boca con agua y beber abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cilantro a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105

CISPROQUIM: 080-050-347

Ayuda LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entregue o deséchela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- No consumir las frutas de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neonicotinas (sustancia natural presente en ciertos anécdotos marinos: mariposas, etc.), con acción de contacto y sistémica, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción sistémica. Controla insectos masticadores y minadores.

Disuirla en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LIM (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	%		
Alfalfa	Guano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Mosca minadora	Liriomyza trichosporus	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Guano defolador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurberiella	0.5	0.1	15	0.02
	Guano mayor de la hoja	Alabama argillacea	0.5	0.1	15	0.02
	Guano menor de la hoja	Alabama argillacea	0.5	0.1	15	0.02
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
Espirago	Guano defolador	Heliothis virescens	0.25-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
	Guano copulador	Spodoptera frugiperda	0.25-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
	Guano defolador	Spodoptera frugiperda	0.25-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
Gruñado	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
Papa	Thrips del pallo	Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.	3
	Polilla	Tuta absoluta	0.35	0.15-0.20	N.D.	3
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.35-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Tomate	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Polilla de la papa	Phthorimaea operculella	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Papa	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	3

LIM: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvales 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes afectados y/o con estadíos larvales 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar al área tratada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de dudas recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-0.5