

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Dañino si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación moderada a la piel. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 12 horas después de aplicado el producto al área tratada.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar fuera de la casa-habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
- En caso de intoxicación llame de inmediato al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico. Administrar agua si la persona es capaz de deglutir. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. (Retire los lentes de contacto).
- En caso de contaminación dérmica, remover la ropa contaminada lavar, la piel con abundante agua y jabón durante 30 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladar a un centro médico si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX:0800-1- 3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA:0801-10200 ó CISPROQUIM:080-050-847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VOLANDERO-AG es un insecticida que actúa principalmente por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso provocando parálisis en larvas, las que dejan de alimentarse y mueren por inanición. Por su movimiento translaminar penetra en los tejidos actuando por mayor tiempo contra comedores de hojas.

Para la preparación de la mezcla:

- Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.
- Se sugiere un gasto promedio de agua de 700 litros, la aplicación debe de realizarse con un a presión promedio de 1 bar (15 psi).

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Espárrago	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30 - 50	150 - 250	28	0.01
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	30	105	28	0.01
Pimiento	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	40 - 60	60 - 210	7	0.02
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	40 - 60	60 - 240	7	0.02
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	30 - 50	30 - 100	3	0.01
	Gusano medidor de la hoja	<i>Oxydia vesulia</i>	40 - 60	40 - 294	3	0.01
Alcachofa	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30 - 60	82.5 - 165	7	0.01

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una vez por campaña y cuando se alcance el umbral de 5 larvas por metro lineal en el cultivo de espárrago.

En el cultivo de pimiento y alcachofa realizar cuatro aplicaciones por campaña como máximo.

En el cultivo de palto para el control de *Oiketicus kirbyi* realizar dos aplicaciones por campaña como máximo. Para el control de *Oxydia vesulia*, se recomienda aplicar VOLANDERO-AG a la menor dosis (40g/200L) cuando las infestaciones sean bajas y se presenten larvas de los primeros estadios. Aplicar VOLANDERO-AG a la mayor dosis (60g/200L) cuando las infestaciones sean altas y se presenten larvas de los últimos estadios. Realizar tres aplicaciones por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

VOLANDERO-AG es compatible con gran parte de los plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física, química y biológica.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas”

