

SIZE: 10.5 x 14.5 cm

VOLANDERO-AG

INSECTICIDA AGRÍCOLA**GRÁNULOS SOLUBLES - SG****COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Emamectin benzoate.....50 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1.0 Kg

Registro PQUA N° - SENASA**TITULAR DEL REGISTRO:****AGRIMORPHO S.A.C**

Urb. Los Jardines del Golf Mz. 3 - Lt. 8, Distrito Victor Larco Herrera - Trujillo, La Libertad - Perú
Telf: 044 - 289877 - Nextel: 831*5780, ventas@agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD.
393 East Heping Road Shijiazhuang City - Hebei Province P.R. China
Teléfono: 86 - 311 - 85916150 / 85916151

IMPORTADOR:

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : 100 g
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

SIZE: 10.5 x 14.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN**

- Dañino si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación moderada a la piel. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 12 horas después de aplicado el producto al área tratada.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar fuera de la casa-habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
- En caso de intoxicación llame de inmediato al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico. Administrar agua si la persona es capaz de deglutir. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. (Retire los lentes de contacto).
- En caso de contaminación dérmica, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón durante 30 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladar a un centro médico si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 ó
CISPROQUIM: 080-050-847**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS Y USOS

Cultivo	Plagas	Nombre científico	Dosis		PC	LMR
			g/200 L	g/ha		
Espárrago	Nombre común	Spodoptera frugiperda	30 - 50	150 - 250	28	0.01
	Gusano ejido	Heliothis virescens	30	105	28	0.01
Pimiento	Nombre común	Spodoptera frugiperda	40 - 60	60 - 210	7	0.02
	Gusano perforador	Heliothis virescens	40 - 60	60 - 240	7	0.02
Palo	Nombre común	Cnephia piri	30 - 50	30 - 100	3	0.01
	Gusano medidor de la hoja	Oryctes verreauxi	40 - 60	40 - 254	3	0.01
Alcachofa	Nombre común	Spodoptera frugiperda	30 - 50	102.5 - 165	7	0.01
	Gusano ejido	Spodoptera frugiperda	30 - 50	102.5 - 165	7	0.01

PC: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas."

