

28.3 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.8 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNLOSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es sensibilizante dérmico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiate, lave la ropa contaminada y báñate con abundante agua y jabón.
- El producto es tóxico para los ojos, la piel o por inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para regresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No amasar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni trajes.
- No reensacar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pirritrilo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llame a:
URCOTOX: 0800 - 1 - 3040

NEOGRUM SAC: 017-4400
ALTO ESSALUD: 0001-10200 (Oraluto)

- No tiene antidoto específico.
- Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego muéstralo al bicho o al bicho local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acervo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con mapas hídricos superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CAMPAL[®] PLUS 100EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Alifospermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 600 - SENASA

Titular del Registro, Importador y distribuido por:
NEOGRUM S.A.C.

neogrum
Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-4400 / Fax: 017-4401

Contenido neto: 1 L

F de Form.
N° de Lot: "Ver parte superior"
F de Venc.

Formulado por:
LEEDS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
M 15, Greater Kailash II, Opposite to Arya
Samaj Mandir, New Delhi - INDIA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPAL[®] PLUS 100 EC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemipteros, etc. a muy bajas dosis. Debido a sus efectos insecticidas mata posturas y ninfas por contacto, y las larvas por contacto e ingestión.

CAMPAL[®] PLUS 100 EC se prepara la mezcla diluyendo la dosis en la mitad de agua del volumen total a utilizar, se agita bien y se completa con agua hasta llenar el cilindro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	litro (dosis)	litro (dosis)	litro (dosis)
Algodón	Arateado	Dysdercus personatus	0.2	0.4	14	0.2
Obolita	Trips	Trips fabae	0.25-0.3	-	14	0.1
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.125	-	14	0.05
Yd	Trips	Frankliniella tritici	0.1-0.15	-	14	0.5

P.C.: Período de carencia.

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación del producto cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, previo monitoreo de campo.

Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda reingresar al campo tratado después de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

CAMPAL[®] PLUS 100 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

FITOTOXICIDAD:

CAMPAL[®] PLUS 100 EC no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se usa según lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

2.3 cm

15.0 ± 0.3 cm