



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERU S.A.

Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia. Telf.: 219 3901.

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.

Development Zone, Binjiang Hangzhou, China

9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech

KINGTAI CHEMICALS CO., LTD

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Teléfono: 219 3901 / Fax: 219 3929.

Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.

DROKASA PERU S.A.

TITULAR DEL REGISTRO:

Capacidad	Material	1/4 litro tereftalato (PET).	Galtonera de polietileno de alta densidad (PEAD).	4 litros densidad (PEAD).	20 litros Bidón de polietileno de alta densidad (PEAD).
-----------	----------	------------------------------	---	---------------------------	---

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

- Estado físico : Líquido
- Color : Amarillo claro
- Olor : Ligera y ligeramente irritante

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

DK-FUNG®

FUNGICIDA AGRÍCOLA TRIAZOLES


EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

Reg. PQUA N° 658 - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Tebuconazole.....250 g/L
Aditivos.....c.sp. 1L

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)petan-3-ol

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₆H₂₂ClN₃O
PESO MOLECULAR : 307.8

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:
Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Características de los equipos de aplicación y ropa

- Respiratorias.
- Es tóxico por inhalación, causa irritación a las vías.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos y la piel.
- repelido causa reacciones alérgicas a la piel.
- Es sensibilizante a la piel. El contacto prolongado o etiquetado y cerrado.
- Conservar el producto en el envase original, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar ni transporte conjuntamente con jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bñese con abundante agua y primeras 48 horas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las de mezcla y aplicación.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones

APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y PRECAUCIONES

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

los agentes oxidantes (pH > 10) o altamente ácidos (pH < 3).

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: **DK-FUNG**, debe aplicarse con aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien todo el cultivo.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas”.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Si cae en los ojos, sujete el párpado, manteniendo el ojo abierto y enjuague lentamente con abundante agua limpia al menos durante 15 - 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, retírelos inmediatamente, después de limpiarlos con agua jabonosa. Si la irritación persiste o se desarrolla después del lavado, llevar al paciente al médico. Si cae en la piel, quítese la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acuda al médico o Centro de Salud

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: Si la persona está consciente provoque el vómito con agua salada y tibia (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada vaso de agua tibia). Si se requiere personal médico puede realizar un lavado gástrico. El carbón activado medicinal puede ligar las sustancias tóxicas aún no absorbidas.

Síntomas específicos de intoxicación:
Por inhalación: dolor de cabeza, mareo.
Por contacto con la piel: irritación a la piel.
Por ingestión: malestar estomacal, diarrea.

Instrucciones de primeros auxilios
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Instrucciones de almacenamiento
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y conservelos en un lugar fresco y seco. No almacenar ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No almacenar en casa de habitación.

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Frecuencia y época de aplicación: **DK-FUNG**, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda realizar una aplicación/campaña/año, como máximo.

Mecanismo de acción: **DK-FUNG**, es un fungicida sistémico de efecto protector, curativo. Es rápidamente absorbido dentro de las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétala.

Modo de acción: **DK-FUNG**, interfiere con la biosíntesis del ergosterol de los hongos. Exhibe dos mecanismos de inhibición de la biosíntesis del ergosterol. Tebuconazole resulta en la acumulación de trimethylesteroles como resultado de la inhibición de la demetilación del ¹⁴C. Además, esto conduce a una acumulación de 3 esteroides delta⁵ en los hongos filamentosos. Se cree que debido a estos interfiere tanto con la secuencia de la reacción que conduce a la isomerización del delta⁸ y delta⁷ o a efectos directos sobre la membrana que por si mismo induce a un efecto indirecto en la composición de los esteroides.

Compatibilidad: Es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con



autoridades locales para este fin.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- Evitar el uso del producto en zonas con napas permeables.

- Evitar el uso del producto en zonas con napas permeables.

- Peligroso para peces, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante de envases vacíos del producto.

- Peligroso para peces, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante de envases vacíos del producto.

AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL

- **ESSALUD** Telf.: 423-7600

- **CICOTOX** Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas)

En caso de EMERGENCIAS llame a:

abundancia. Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Tratamiento sintomático y de sostén. No existen

TRATAMIENTO MÉDICO

Si es necesario consiga atención médica.

proporcione respiración artificial, de preferencia boca a boca.

contaminada. Si la respiración fuera a detenerse, primero traslade al paciente al aire fresco o zona no

Instrucciones si el producto ha sido inhalado:

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.

Si la persona está consciente administrar fluidos en antídotos específicos.

Si se requiere realice lavado gástrico.