

Medidas: 24.5 cm x 6 cm
Actualizado: Set. 2014
ML

Abrir
aquí


LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Celtic

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

MONTANA



- **Grupo Químico:** Estrobilurina + Triazol
- **Tipo de formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Registro:** PQUA N° 663 - SENASA
- **Nombre común:** Azoxystrobin (200 g/L) + Tebuconazole (125 g/L)
- **Nombre químico:** methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate (azoxystrobin) y (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (tebuconazole)
- **Fórmula empírica:** C₂₂H₂₁N₃O₅ (azoxystrobin) y C₁₄H₂₂ClN₂O (tebuconazole)
- **Peso molecular:** 403.4 g/mol (azoxystrobin) y 307.82 g/mol (tebuconazole)
- **Fórmula estructural:**

- **Propiedades físicas y químicas:**
- **Aspecto:** Líquido
- **Color:** Amarillo
- **Olor:** Característico
- **pH:** 5 - 6
- **Densidad relativa:** 1.085 - 1.115 g/ml a 20 °C
- **Punto de inflamación:** > 120 °C

- **Capacidad y clase del envase:** 250 mL en frasco
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av. Los Rosales 280. Santa Anita. Lima - Perú.
- **Formulado por:** INDICEM ACLEDIN S.A. Ejiyo 1415 Esc. 502. Montevideo, Uruguay.
- **Distribuido por:** MONTANA S.A. Av. Los Rosales 280. Santa Anita. Lima - Perú.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar en casa-habitación, ni almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes; conservarlo en un lugar fresco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas podrá utilizarse para contener agua o alimento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar nada por la boca a una persona inconsciente ni impedir el vómito si es de forma espontánea. Obtener asistencia médica inmediatamente o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, y retirar al afectado de la zona tratada. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua limpia y fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada y trasladarlo a un lugar ventilado. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte el médico.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático.

Medidas: 24.5 cm x 6 cm
Actualizado: Set. 2014
ML

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040 (GRATUITO) O 328-7398
CISPROQUIM: 0800-50847 (GRATUITO)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CELTIC** es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antisporulante. Tiene actividad translinar, lo cual lo hace muy eficaz para el control de los cultivos densos.
- **CELTIC** es un fungicida compuesto por una mezcla de fungicidas sistémicos que potencian sus propiedades particulares. El tebuconazole afecta a la membrana de los hongos patógenos inhibiendo la producción de ergosterol, mientras que el azoxystrobin tiene acción oligosistémica, alterando los procesos respiratorios en las mitocondrias de los hongos, por lo que impide la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno.
- **CELTIC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones

al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(ml/200L)		
Capsicum annum	Oídiosis	Leveillulataurica	0.4	-	14	3.0* 0.5**
Cebolla	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.4-0.5	-	35	10* 0.05**
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	0.4-0.5	-	21	2.0* 2.0**
Alcachofa	Oídiosis	Leveillulataurica	0.4-0.5	-	7	5* 0.5**
Café	Roya de café	Hemileia vastatrix	-	300-500	30	0.1* 0.1**

PC: Período de Carenia
 LMR: Límite Máximo de Residuos
 (*) Azoxystrobin, (**) Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Aplicar **CELTIC** dos (02) veces por campaña como máximo, considerando una campaña al año. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

- El intervalo de aplicación no es menor a 15 días.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CELTIC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Antes de efectuar una mezcla, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar. Es incompatible con hidróxido de cobre y oxiclóruo de cobre.

FITOTOXICIDAD

CELTIC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.