

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm  
DICIEMBRE 2024  
ML

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar en casa-habitación, ni almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes; conservarlo en un lugar fresco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas podrá utilizarse para contener agua o alimento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar nada por la boca a una persona inconsciente ni impedir el vómito si es de forma espontánea. Obtener asistencia médica inmediatamente o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, y retirar al afectado de la zona tratada. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua limpia y fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada y trasladarlo a un lugar ventilado. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
GENAGRO S.A.: (01) 419 3030

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Celtic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Azoxystrobin..... 200 g/L  
Tebuconazole..... 125 g/L  
Aditivos ..... csp1L

Reg. PQUA N° 663- SENASA

Titular del Registro:  
GENAGRO S.A

Formulado por:  
INDICEM ACLEDIN S.A.  
Ejido 1415 Esc. 502.  
Montevideo – Uruguay.

Contenido Neto: 1L

Lote N°:  
Fecha de Fab:  
Fecha de Exp:



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Importado y distribuido por:  
GENAGRO S.A.  
Av. Javier Prado Este N° 6210  
Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.  
Teléfonos: (511) 4193030  
E-mail: info@genagro.com



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CELTIC®** es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Tiene actividad translaminar, lo cual lo hace muy eficaz para el control de los cultivos densos.
- **CELTIC®** es un fungicida compuesto por una mezcla de fungicidas sistémicos que potencian sus propiedades particulares. El tebuconazole afecta a la membrana de los hongos patógenos inhibiendo la producción de ergosterol, mientras que el azoxystrobin tiene acción oligosistémica, alterando los procesos respiratorios en las mitocondrias de los hongos, por lo que impide la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno.
- **CELTIC®** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(ml/200L)		
Capicum annum	Oidiois	Leveillula taurica	0.4	-	14	3.0* 0.5**
Cebolla	Mancha foliar	Sternophyllum vesicarium	0.4 - 0.5	-	35	10* 0.05**
Vid	Oidiois	Erysiphe necator	0.4 - 0.5	-	21	2.0* 2.0**
Alcachofa	Oidiois	Leveillula taurica	0.4 - 0.5	-	7	5* 0.5**
Café	Roya de café	Hemileia vastatrix	-	300 - 500	30	0.1* 0.1**

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

(\*) Azoxystrobin, (\*\*) Tebuconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Aplicar **CELTIC®** dos (02) veces por campaña como máximo, considerando una campaña al año. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.
- El intervalo de aplicación no es menor a 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CELTIC®** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Antes de efectuar una mezcla, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar. Es incompatible con hidróxido de cobre y oxiclورو de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

