VÉRAZ® 690 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Dimethomorph..... 100 g/kg
Mancozeb..... 605 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Registro Nº 665 - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **500 g**

F. de Form.
Nº Lote
F. de Venc.

Silvestre
Protección Vegetal

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico y nocivo por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante a las vías respiratorias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, usar equipo de protección ocular y dermal.
- El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel, no exponerse directamente al producto sin equipo de protección personal.
- Evite el contacto directo del producto, usar equipo de protección personal y cubrir la cabeza.
- Evitar el uso del producto por personas en estado de embarazo (posible carcinógeno y daño a la placenta).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado, evitar el transporte con alimentos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico:
Morfolinas (dimethomorph) + Ditiocarbamatos (Mancozeb).

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto:
  Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser el recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERAZ® 690 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y dimethomorph (fungicida translaminar, curativo de sistemicidad local).

VERAZ® 690 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **VERAZ® 690 WP** (Dimethomoph + Mancozeb) máximo una aplicación por campaña por año. Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada después de 2 horas de aplicada el producto.

COMPATIBILIDAD

VERAZ® 690 WP es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

VERAZ® 690 WP no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	-	1.5	7	0.02 (Dimethomorph) 1.0 (Mancozeb)
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	0.5 - 1	-	14	0.05 (Dimethomorph) 0.2 (Mancozeb)
VID	"Mildiu"	*Plasmopara viticola*	-	1.5	66	3.0 (Dimethomorph) 5.0 (Mancozeb)
QUINUA	"Mildiu"	*Peronospora farinosa*	0.50 -1	-	7	0.05 (Dimethomorph) 0.05 (Mancozeb)

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC**: Período de Carencia.