

Verzus[®]



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

EMAMECTIN BENZOATE 50 g/kg

Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 667 – SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena Del Mar
Lima - Perú
Telf.: (51 1) 614-5100

Formulador:
**HEBEI VEYONG
BIOCHEMICAL CO., LTD.**
393 East Heping Road,
Shijiazhuang City - China



Contenido Neto: 100 g
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación en la piel. Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla, carga y aplicación y para ingresar durante las primeras 12 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área tratada a niños, personas en general ni animales domésticos.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar fuera de la casa habitación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectina (Lactona Macroclíctica).

En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.

En caso de ingestión, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar con abundante agua por lo menos durante 20 minutos y consulte a un médico oftalmólogo.

En caso de Inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

NOTA AL MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

INFOSALUD 113

CICOTOX: (01) 328 - 7700 (Línea gratuita)

ESSALUD: (01) 411 - 8000, opción 4 (Línea gratuita)

INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin. Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales para ello; no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|--|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | N. COMÚN | N. CIENTÍFICO | kg/ha | kg/200L | | |
| Espárrago <i>Asparagus officinalis</i> | Caballada (gusano ejército) | <i>Spodoptera eridania</i> | 0.2 | - | 30 | 0.01 |
| | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i> | | | | |
| | Gusano de tierra | <i>Copitarsia decolora</i> | 0.3 - 0.4 | - | | |
| | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.25 - 0.40 | - | | |
| Maíz <i>Zea mays</i> | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.125 - 0.150 | - | 7 | 0.01 |
| Pimiento <i>Capiscum annuum</i> | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i> | 0.150 - 0.200 | - | 3 | 0.02 |
| Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i> | 0.150 - 0.175 | - | 3 | 0.02 |
| Alicachofa <i>Cynara scolymus</i> | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.175 - 0.200 | - | 7 | 0.10 |
| Arándano <i>Vaccinium myrtillus</i> | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i> | - | 0.080 - 0.090 | 14 | 0.01 |
| Pallo <i>Persea americana</i> | Gusano medidor | <i>Sabulodes aegrotata</i> | - | 0.070 - 0.080 | 14 | 0.01 |
| | Gusano del cesto | <i>Oiketicus kirbyi</i> | 0.30 - 0.50 | - | | |
| Vid <i>Vitis vinifera</i> | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | - | 0.07 - 0.08 | 10 | 0.01 |
| Gramado <i>Fragaria granatum</i> | *Gusano perforador del ápice de la bellota | <i>Pococera atramentalis</i> | 0.24 | 0.080 | 20 | 0.01 |

PC: Período de Carencia

ppm: Partes por millón

LMR: Límite Máximo de Residuos

PE-VERZU-V01-20

