

# Verzus<sup>®</sup>



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS SOLUBLES (SG)**

**COMPOSICIÓN:**

EMAMECTIN BENZOATE ..... 50 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 667 – SENASA**

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*

**Títular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**

**NINGBO GENERIC  
CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, No. 8,  
Lengjing Street, Ningbo 315010  
Telf.: +86 574 87301088  
Zhejiang, China



**Contenido Neto: 500 g**

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación en la piel.  
 Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla, carga y aplicación y para ingresar durante las primeras 12 horas después de la aplicación.  
 No permitir el ingreso al área tratada a niños, personas en general ni animales domésticos.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar fuera de la casa habitación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Avermectina (Lactona Macroclícica).

**En caso de intoxicación o ingestión,** lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.

**En caso de ingestión,** no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

**En contacto con los ojos,** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

**En contacto con la piel,** quitar la ropa y lavar con abundante agua por lo menos durante 20 minutos y consulte a un médico oftalmólogo.

**En caso de Inhalación,** retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

**NOTA AL MÉDICO:** Dar tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**INFOSALUD 113**

**CICOTOX: (01) 328 – 7700 (Línea gratuita)**  
**ESSALUD: (01) 411 – 8000, opción 4 (Línea gratuita)**  
**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin. Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales para ello; no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales sen el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VERZUS®** es un insecticida no sistémico que penetra los tejidos de las hojas por movimiento translaminar.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar.

Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **VERZUS®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar.

Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **VERZUS®** cuando se observe la presencia de la plaga en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

El producto es incompatible con agentes oxidantes. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no presenta efectos fitotóxicos a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO                                   | PLAGA                                      |                              | DOSIS         |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                           | N. COMÚN                                   | N. CIENTÍFICO                | kg/ha         | kg/200L       |              |              |
| Espárrago<br><i>Asparagus officinalis</i> | Caballada (gusano ejército)                | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.2           | -             | 30           | 0.01         |
|                                           | Gusano perforador grande de la bellota     | <i>Heliothis virescens</i>   |               |               |              |              |
|                                           | Gusano de tierra                           | <i>Copitarsia decolora</i>   | 0.3 - 0.4     | -             |              |              |
|                                           | Gusano cogollero                           | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.25 - 0.40   | -             |              |              |
| Maíz<br><i>Zea mays</i>                   | Gusano cogollero                           | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.125 - 0.150 | -             | 7            | 0.01         |
| Pimiento<br><i>Capiscum annum</i>         | Gusano perforador grande de la bellota     | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.150 - 0.200 | -             | 3            | 0.02         |
| Tomate<br><i>Lycopersicon esculentum</i>  | Gusano perforador grande de la bellota     | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.150 - 0.175 | -             | 3            | 0.02         |
| Alcachofa<br><i>Cynara scolymus</i>       | Gusano cogollero                           | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.175 - 0.200 | -             | 7            | 0.10         |
| Arándano<br><i>Vaccinium myrtillus</i>    | Gusano perforador grande de la bellota     | <i>Heliothis virescens</i>   | -             | 0.080 - 0.090 | 14           | 0.01         |
| Palto<br><i>Persea americana</i>          | Gusano medidor                             | <i>Sabulodes aegrotata</i>   | -             | 0.070 - 0.080 | 14           | 0.01         |
|                                           | Gusano del cesto                           | <i>Oiketicus kirbyi</i>      | 0.30 - 0.50   | -             |              |              |
| Vid<br><i>Vitis vinifera</i>              | Gusano cogollero                           | <i>Spodoptera frugiperda</i> | -             | 0.07 - 0.08   | 10           | 0.01         |
| Granado<br><i>Punica granatum</i>         | "Gusano perforador del ápice de la bellota | <i>Pococera atramentalis</i> | 0.24          | 0.080         | 20           | 0.01         |

PC: Período de Carenacia  
 ppm: Partes por millón

LMR: Límite Máximo de Residuos

PE-VERZU-V01-20

