

19 cm

19 cm

# Verzus®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

#### COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate ..... 50 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1 Kg

### PQUA N° 667 - SENASA

## INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**

**INTEROC S.A.**  
Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

**Formulador:**  
**NINGBO GENERIC  
CHEMICAL Co., LTD**  
Room 10-6, Shidai Square, No. 8,  
Lengjing Street, Ningbo 315010  
Telf.: +86 574 87301088  
Zhejiang - China

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **1Kg**  
Fecha de Vencimiento :

### NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

### LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación en la piel. Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla, carga y aplicación y para ingresar durante las primeras 12 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área tratada a niños, personas en general ni animales domésticos. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar fuera de la casa habitación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Avermectina (Lactona Macroclícica)  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
En caso de intoxicación por inhalación remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.  
En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.  
En caso de contacto con la piel o ropa lavar con abundante agua por lo menos durante 20 minutos y consulte a un médico oftalmólogo.  
Nota al médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
EsSALUD en línea: 411-8000 opción 4. CICOTOX: 0800-1-3040  
(Línea gratuita) o 328-7398. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.  
Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	“Caballada (gusano ejército)”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	30	0.5
	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>			
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125 - 0.150	7	0.01
Pimiento	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.200	3	0.02
Tomate	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.175	3	0.02
Alcachofa	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175 - 0.200	7	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**VERZUS** es un insecticida no sistémico que penetra los tejidos de las hojas por movimiento translaminar.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **VERZUS** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **VERZUS** cuando se observe la presencia de la plaga en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** El producto es incompatible con agentes oxidantes. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.



23 cm

3.4 cm