

Verzus®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 50 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA Nº 667 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO., LTD.
11-Zitanyaju,
126 Mengdu Street
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 5Kg
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación en la piel. Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla, carga y aplicación y para ingresar durante las primeras 12 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área tratada a niños, personas en general ni animales domésticos. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar fuera de la casa habitación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Avermectina (Lactona Macroclícica)
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
En caso de intoxicación por inhalación remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.
En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.
En caso de contacto con la piel o ropa lavar con abundante agua por lo menos durante 20 minutos y consulte a un médico oftalmólogo.
Nota al médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
EsSALUD en línea: 411-8000 opción 4, CICOTOX: 0800-1-3040
(Línea gratuita) o 328-7398. Para mayor información llamar a
INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	“Caballada (gusano ejército)”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	30	0.5
	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>			
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125 - 0.150	7	0.01
Pimiento	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.200	3	0.02
Tomate	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.175	3	0.02
Alcachofa	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175 - 0.200	7	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

