

Verzus®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Emamectin benzoate	50 g/Kg
Aditivos	csp 1 Kg

PQUA N° 667 - SENASA



Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO., LTD.
11-Zitanyaju,
126 Mengdu Street
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **5Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

19 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación en la piel.
- Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla, carga y aplicación y para ingresar durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No permita el ingreso al área tratada a niños, personas en general ni animales domésticos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Alejarlo fuera de la casa habitación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

- Grupo Químico: Avertechina (Lactona Macrotrícida)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación remover al individuo para que respire aire fresco y dar respiración artificial si es necesario.
- En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.
- En caso de contacto con la piel o ropa lavar con abundante agua por lo menos durante 20 minutos y consulte al médico oftalmólogo.
- Nota al médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

EsSALUD en línea: 411-8000 opción 4. CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o 328-7398. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
Espárrago	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	---	30	0.01
	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>				
	"Gusano de tierra"	<i>Copitarsia decolora</i>	0.3 - 0.4	---		
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125 - 0.150	---	7	0.01
Pimiento	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.200	---	3	0.02
Tomate	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.150 - 0.175	---	3	0.02
Alcachofa	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175 - 0.200	---	7	0.10
Arándano	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	---	0.080 - 0.090	7	0.01
Palto	"Gusano medidor"	<i>Sabulodes aegrotata</i>	---	0.070 - 0.080	40	0.01

PC: Periodo de Carenacia
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN. CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO.

LMR: Límite Máximo de Residuos

