20 cm

30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- Ligeramente irritante a los ojos y la piel.
- El producto no deberá usarse con personas gestantes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Dithiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar al vómito o realizar lavado gástrico
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 117 **CISPROQUIM: 0800-50847**
CICOTOX: 08001-3040 **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BLINDADO 80 PM es un fungicida preventivo de contacto utilizado para prevenir infecciones causadas por *Cercospora asparagi* en espárrago y *Alternaria solani* en tomate. Impide la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo del patógeno.

BLINDADO 80 PM se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar la aplicación de **BLINDADO 80 PM** cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña/año. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD
BLINDADO 80 PM es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD
BLINDADO 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg / 200 L	DOSIS kg / ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico				
Espárrago	Cercosporiosis	*Cercospora asparagi*	0.75	1.5	28	0.1
Tomate	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.5	1.5	5	2

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.: Límite máximo de residuos**

20 cm

30 cm

BLINDADO 80 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Mancozeb ..... 800 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 671 - SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING SAC

Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:
Contenido Neto: 1 Kg

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang Distric, Shanghai
CHINA

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

NOMBRE COMERCIAL
C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA	
Logo Inflamable	C:0 M:100 Y:0 K:0
Logo Explosivo	C:0 M:0 Y:100 K:0
NEGRO	C:0 M:0 Y:0 K:100
Banda toxicológica	C:100 M:70 Y:0 K:0