

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir
- Es moderadamente peligroso. Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es irritante para los ojos, evite el contacto.
- No permita el ingreso de niños. Personas en general y animales a la zona tratada con este producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de ingestión: Provoque el vómito administrando al accidentado un vaso de agua tibia con una cucharadita de sal común. No administre nada a una persona inconsciente. Lave la ropa y lleve inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico.
- En caso de contaminación de ojos, lave al afectado con abundante agua por mínimo 15 minutos, tape el ojo y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire a la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que este respire.

Antídoto: Administrar atropina de 2 - 4 miligramos por vía intravenosa en adultos (0.5 - 2 mg en niños según el peso) hasta la completa atropinización. Llamar inmediatamente al médico. Este producto inhibe la colinesterasa. No debe dar morfina en ningún caso. Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 0800-1-3040, ESSALUD: 0801-10200; CISPROQUIM: 0800-50847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido del plaguicida en otros envases.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



® Marca registrada

MOCAP® 400 CS

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN - CS

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ethoprophos..... 400 g/l
Aditivoscsp 1 Litro

Reg. PQUA N°-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Av. 28 de Julio N° 150 - Piso 7 - Miraflores
Telf.: 219-3901 Fax: 219-3929

FORMULADO POR: Bayer CropScience
D-51368 Leverkusen, Alemania



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MOCAP 400 CS es un inhibidor de acetil colinesterasa, actúa a nivel del sistema nervioso central inhibiendo la acción de la enzima acetilcolinesterasa. Sus efectos subletales causan modificaciones en la dispersión de nemátodos, en el reconocimiento del hospedante y en la penetración radicular.

MOCAP 400 CS actúa por contacto, a altas concentraciones resulta en parálisis y muerte de nemátodos.

Es recomendable preparar previa mezcla en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión. La aplicación se realiza en drench dirigido al cuello de la planta

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO

CULTIVO	PLAGAS		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Nemátodo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	18 - 20	60	0.2

PC = Período de carencia (días)

LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MOCAP 400 CS se aplica en forma general cuando comienza el ataque de los nemátodos, previa evaluación del nivel de daño económico en el cultivo.

Se recomienda 1 (una) aplicación por campaña por año.

PERÍODO DE REENTRADA

24 horas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con productos comunmente usados en agricultura, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

MOCAP 400 CS posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

