



(*Paecilomyces lilacinus*)

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Paecilomyces lilacinus 200 g/kg (*)
 Aditivos C.S.P 1kg (**)
 (*) Concentración mínima de 1 x 10⁶ esporas/g
 (**) Contiene 20% de carbono orgánico oxidable total (ECCA Carboxy)

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 251 - SENASA

Formulado por

INNOVAK COLOMBIA LTDA

Carrera 74AN*22-31 oficina 201 Bogota D.C. - Colombia

Distribuido por



Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa
 Ate. Lima - Perú
 Telef. 348-3887
 R.U.C N° 20506704217

Titular del registro



INNOVAK PERU S.A.C.
 Jr. Aurelio Miro Quesada N° 508,
 San Martín de Porres - Lima 31
 www.innovakglobal.com

Importado por:



Contenido neto: 1 kg.

Lote N°:

F. Fab:

F. Venc.:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, MANEJO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.

- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reintegrarse al área tratada en las primeras 24 horas.

- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Teléfono de emergencia: AVO ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita)

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está inconsciente.

- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.

- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO

DL50 oral > 6949 mg/kg.

DL50 dermal > 2000 mg/kg.

No es irritante dérmico ni ocular

No es sensibilizante cutáneo

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIFICACIONES USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	UAC (g.p.m)	L.M.R (g.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento

UAC: Última aplicación antes de la cosecha

L.M.R: Límite Máximo de Residuo en ppm

"Manténgase alejado de las personas animales, productos alimenticios y medicinales"

"Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto"



LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION