



AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Paecilomyces lilacinus 200 g/kg (*)
Aditivos C.S.P 1kg(**)

(*) Concentración mínima de 1×10^6 esporas/g

(**) Contiene 20% de carbono orgánico oxidable total (ECCA Carboxy)

Reg.PBUA Nº 251 - SENASA

Titular del Registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Importado y Distribuido por:

AgroKlinge
Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa
Ale, Lima - Perú
Telf: 348-3887
R.U.C.N° 20508704217

Contenido neto: 1 kg.

Lote N°:

F. Formulacion:

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

Formulado por:

Innovak
INNOVAK COLOMBIA LTDA
Carrera 74AN*22-31 Oficina 201
Bogotá D.C. - Colombia

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEMAROOT es un nematocida biológico para controlar nematodos filoparásitos. Contiene esporas del hongo *Paecilomyces lilacinus* y un aditivo a base de ácidos carboxílicos que actúa como un acondicionador orgánico del suelo para favorecer el establecimiento y actividad del hongo en la rizosfera, y un mejor desarrollo radicular.

Sistemas de preparación y aplicación:

Aplicar en forma de drench empleando equipos manuales, a motor o montados sobre el tractor, con boquillas que permitan concentrar la aplicación alrededor de la base de la planta, en la zona radicular. Para preparar la mezcla disolver la cantidad necesaria del producto en el tanque de aplicación con poca agua, revolviendo bien hasta conseguir una solución uniforme, luego completar hasta el volumen de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar, previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de 2 veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos base, con sustancias de pH alcalino o con fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor a 565 Sm.

FITOTOXICIDAD: NEMAROOT no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	UAC (días)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento

UAC: Última aplicación antes de la cosecha

L.M.R. Límite Máximo de Residuos en ppm

