



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Paecilomyces lilacinus200 g/kg (*)
Aditivos.....C.S.P 1kg(***)
(*) Concentración mínima de 1×10^8 esporas/g
(**) Contiene 20% de carbono orgánico oxidable total (ECCA Carboxy)

Reg. PBUA N° 251 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantitas
Los Olivos - Lima 39

Formulado por:



INNOVAK COLOMBIA LTDA
Carrera 74AN°22-31 Oficina 201
Bogotá D.C. - Colombia

Contenido neto: 5 kg.
Lote N°:
F. Formulacion:
F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
-Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
PRIMEROS AUXILIOS.
- Teléfono de emergencia: ALO ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13940 (línea gratuita)
-En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está consciente.
-En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
-En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Sistemas de preparación y aplicación:
Aplicar en forma de drench empleando equipos manuales, a motor o montados sobre el tractor, con boquillas que permitan concentrar la aplicación alrededor de la base de la planta, en la zona radicular. Para preparar la mezcla disolver la cantidad necesaria del producto en el tanque de aplicación con poca agua, revolviendo bien hasta conseguir una solución uniforme, luego completar hasta el volumen de aplicación.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de 2 veces por campaña

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación

COMPATIBILIDAD: No es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos base, con sustancias de pH alcalino o con fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor a 5dS/m.

FITOTOXICIDAD: NEMAROOT no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	UAC (dias)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Nematodo del nódulo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	1 kg/ha	Exento	Exento

UAC: Última aplicación antes de la cosecha

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en ppm

