



COMPOSICIÓN:	
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	200 g/kg (*)
Aditivos.....	C.S.P 1 kg(**)
(*) Concentración mínima de 1 x 10 ⁸ esporas/g	
(**) Contiene 20% de carbono orgánico oxidable total (ECCA Carboxy)	

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Req.PBUA N° 251 - SENASA

Formulado por

INNOVAK COLOMBIA LTDA

Carrera 74AN°22-31 oficina 201 Bogotá D.C. - Colombia

Distribuido por



Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa
Ate, Lima - Perú
Telf: 348-3887
R.U.C N° 20508704217

Titular del registro



INNOVAK PERU S.A.C.
Jr. Aurelio Miro Quesada N° 508.
San Martín de Porres - Lima 31
www.innovakglobal.com

Importado por:



Contenido neto: 20 kg.

Lote N°:

Falls

F. Vencelj

**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utiliza ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debiera utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita)
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO

DL50 oral > 6349 mg/kg.
DL50 dermal > 2000 mg/kg.
No es irritante dérmica ni ocular.
No es sensibilizante cutáneo.
No existe antídoto específico. E

NO EXPLOSIVO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

NO CORROSIVO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIFICACIONES
USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	UAC (días)	L.M.R. (g.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Plintio (Capsicum annuum)	"Nematodo del nódulo"	Meloidogyne incognita	1 kg/ha	Exento	Exento
Vid (Vitis vinifera)	"Nematodo del nódulo"	Meloidogyne incognita	1 kg/ha	Exento	Exento
Tomate (Solanum esculentum)	"Nematodo del nódulo"	Meloidogyne incognita	1 kg/ha	Exento	Exento

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

U.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

