

Merpan® 80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Captan 800 g/kg
Aditivos c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° 310 - SENASA

Titular del Registro, Importador y
Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60,
Beer Sheva 841001. Israel.

CONTENIDO NETO: **500 gramos**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



ADAMA

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Irritante al tracto respiratorio, utilizar mascarilla de protección.
- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante a los ojos, usar gafas de protección ocular
- Es sensibilizante a la piel, su uso prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Ligeramente irritante a la piel, en todos los casos usar ropa de protección y no mantener la piel expuesta.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximidaz
- En caso de intoxicación por inhalación, sacar a la víctima al aire libre. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno o respiración artificial. Llevar al paciente al médico inmediatamente.
- En caso de intoxicación por ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente esta inconsciente. Llevar al paciente al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 10 - 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de contacto con la piel cambiarse y retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico para prevenir casos de alergia.
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX : 0800- 13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Merpan 80 WG es un fungicida de contacto de amplio rango de acción utilizado para el control preventivo de las enfermedades foliares que se indican en el cuadro de usos. Mantener el agitador en movimiento durante la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ha		
PAPA	Mancha foliar (<i>Alternaria solani</i>)	0.70	1.75	7	0.05
TOMATE	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	-	2 - 3	0	5
VID	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.6 - 0.7	2.5 - 3	7	25

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año, considerando una campaña al año.

Tomate: Usar la dosis baja en aplicaciones preventivas o cuando se reporten los primeros síntomas de la enfermedad (no más del 10% de incidencia). Emplear la dosis alta cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Intervalo entre aplicaciones no menor a 10 días.

Vid: Aplicar entre floración hasta antes de la cosecha, dejando un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días. Se sugiere realizar la primera aplicación en la floración y la segunda durante el envero.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Merpan 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con productos de reacción alcalina y aceites.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos recomendados a las dosis indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



Dimensiones 210 mm x 170 mm