

- Pantone 281
- Pantone 293
- Pantone 584
- Pantone 199
- Pantone 347
- Pantone Black
- Pantone 7516

40 x 15 cms

**LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN**

- Durante el transporte y/o almacenamiento, así como en las operaciones de carga y descarga, evitar rupturas de los envases. Se debe observar estrictamente la prohibición de transportar y/o almacenar plaguicidas agrícolas y/o sustancias afines junto con personas, animales (domésticos, ganado o aves), alimentos (frescos o envasados), bebidas en general, medicinas (de uso humano y/o veterinario), forraje o cualquier otro tipo de alimentos para animales.
- MATCH 50 EC** es altamente tóxico para crustáceos (camarones). Tiene que ser estrictamente evitada la contaminación deliberada o accidental de cualquier fuente de agua. **MATCH 50 EC** es tóxico para abejas. No aplicar cuando las abejas estén libando activamente.
- MATCH 50 EC** es irritante para los ojos y la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado del producto con la piel, siendo recomendable que la manipulación y/o aplicación del producto se haga empleando equipos de protección como guantes y botas de jebe, un protector de nariz y boca y un sombrero o gorro. Cualquier salpicadura a los ojos deber ser lavada inmediatamente con abundante agua limpia y fresca.
- Evitar ingerir el producto inhalar sus vapores o aspirar la neblina de aspersión. No comer, beber ni fumar mientras sea manipula o aplica el producto. Una vez que el usuario finalice la labor debe bañarse con abundante agua enjabonarse bien y cambiarse de ropa, la misma que deberá ser lavada antes de volver a usarse.
- Los equipos y utensilios utilizados deberán ser lavados con abundante agua limpia evitando botar los residuos del lavado en las acequias o canales de regadío, lagos lagunas, estanques o en cualquier otro reservorio o cauce de agua Almacenar el producto en un lugar seco sombreado y ventilado, alejado del calor. Evite almacenar el producto a temperaturas menores a -5 °C o superiores a 35 °C. Almacénese fuera del alcance de los niños y preferentemente bajo llave
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Bezoylurea
- Si se sospechara de una intoxicación por el producto debe retirarse inmediatamente de la labor al afectado colocandolo en un ambiente ventilado y llamar inmediatamente al médico.
- Mostrar al médico el envase etiquetado del producto. Mientras tanto quitarle la ropa de trabajo y lavar con abundante agua limpia las partes contaminadas del cuerpo. Si el producto ha sido ingerido accidentalmente no debe inducirse el vomito. Solo si el afectado esta conciente se le debe suministrar una buena cantidad de carbón medicinal en abundante agua.
- Nada debe darse por la boca mientras el accidentado esta sin conocimiento
- MATCH 50 EC** no tiene antídoto específico, Aplicar terapia sintomática bajo supervisión médica.
- En caso de Emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 6 CISPRDQUIM: 080050847**
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturandolo o perforandolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.



- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Toxico para organismos acuáticos
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

fecha de aprobacion: 16/03/2011

**MATCH® 50 EC**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

Concentrado Emulsionable - EC

Composición  
Lufenuron .....50 g/L  
Aditivos.....Hasta completar 1 L

Reg. N°: 565-98-AG-SENASA

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.  
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima  
Telf: 348 1153 Fax: 348 1020  
RUC: 20307150881

Titular del Registro:  
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
René Descartes 170, Urb. Sta. Raquel,  
II etapa, Ate Vitarte - Lima  
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Formulado por:  
Syngenta S.A.  
Cartagena, Colombia

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



Lote N° :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

CONTENIDO NETO

20 Litros



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Para obtener un control óptimo y económico **MATCH 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 -10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga,
- Se recomienda aplicar **MATCH 50 EC** con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la planta, sobre todo en las zonas donde se encuentran corriendo las larvas de las plagas a controlar. De acuerdo a la experiencia práctica se recomienda emplear entre 200 a 400 litros de caldo insecticida por hectárea con plantas chicas y 600 litros de caldo insecticida por hectárea como mínimo con plantas desarrolladas.
- MATCH 50 EC** puede ser aplicado indistintamente con cualquier equipo convencional aéreo o terrestre (asperjadora manual, de motor o tractorizada) siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquilla tipo cónica. Cuando se utilice asperjadora de espalda a motor se debe calibrar previamente el equipo para procurar aplicar el volumen de insecticidas por hectárea indicado en el cuadro.
- MATCH 50 EC** es fácil de preparar y puede hacerse directamente en el deposito del equipo a utilizar, Basta diluir la cantidad seleccionada del producto en volumen de agua a aplicar. Agítese bien antes de llenar el tanque del equipo a utilizar para obtener una buena y uniforme solución.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200L		
Alcachofa	gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.6 - 0.7	250 - 300	14	0.10
	gusano perforador de hojas	<i>Burculatrix thurbenella</i>	0.5 - 0.75			
Algodón	gusano de hoja	<i>Anomis texana</i>	0.3 - 0.5		28	0.02
	gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.4 - 0.6	200 - 300		
Cítricos	minador de brotes de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>		200 - 300	ND	0.50
Col	gusano o Poilla de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.5	200		
	gusano medidor o pejerrey	<i>Pseudaletia includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160	14	0.1
Coliflor, Col china	cogollero	<i>Heliothis undalis</i>	0.5	200		
Espárrago	gusano de tierra	<i>Prodenia sp.</i>				
	copitarsia	<i>Copitarsia turbata</i>		200	ND	ND
	heliolithis	<i>Heliothis virescens</i>				
Frijol	gusano de los brotes	<i>Epinotia aporena</i>	0.4 - 0.5	150 - 160		
Vainita	gusano pegador de hojas	<i>Hedylepta indica</i>	0.7 - 0.8	200 - 250	35	0.02
	gusano perforador de vainas	<i>Laspesyesia leguminis</i>	0.4 - 0.5	150 - 160		
Garbanzo	gusano silbador	<i>Heliothis virescens</i>		200 - 300		
Granado	gusano perforador	<i>Taillia amatentalis</i>	1.2 - 1.4		30	0.02
Maíz	cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		200	35	0.02
Papa	pollita	<i>Tuta absoluta</i>	0.5 - 0.6	160 - 200		
Tomate	gusano medidor o pejerrey	<i>Pseudaletia includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160	7	0.05
	gusano de tierra y frutos	<i>Prodenia sp.</i>	0.4 - 0.5	150 - 160		
Pimiento	heliolithis	<i>Heliothis virescens</i>	0.6 - 0.7		7	1
	cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		0.1 - 0.2		

P.C.: Periodo de Carencia  
ND: No Determinado

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para obtener un control óptimo y económico **MATCH 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**Match 50 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física alas dosis recomendadas.

**FITOTOXICIDAD**

**Match 50 EC** a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

**Responsabilidad Civil.** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

