

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040
INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ADAMA

Custodia®
32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)


COMPOSICIÓN:
 Tebuconazole 200 g/L
 Azoxystrobin 120 g/L
 1,2-benzotiazolin-3-one 0.4 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 675- SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agrícola Perú S.A.
 Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
 Miraflores. Lima - Perú.
 Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
 Calle 1C N° 7-53 Interior Zona Franca.
 Barranquilla, Colombia.



CONTENIDO NETO: **500 ml**

Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estados iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.5	-	7	0.6 ¹ / 5.0 ²
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				
Arroz	Quemado del Arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5 - 0.7	-	35	2.0 / 5.0
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.3	30	0.1 / 0.02
Cebolla	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	-	14	0.1 / 1.0
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	-		
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.6	-	nd	0.05 / 0.01
Fresa	Oidiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.20 - 0.25	5	0.1 / 10
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.25 - 0.30		
Maíz	Mancha del Asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	-	0.2 - 0.3	15	0.6 / 0.02
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2	nd	5.0 / 15.0
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.15 - 0.25	nd	0.05 / 0.7
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5 - 0.7	-	nd	0.02 / 1.0
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	-	7	1.0 / 3.0
		<i>Erysiphe necator</i>				
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	-	14	6.0 / 2.0
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				

PC.: Periodo de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
 nd.: no determinado ¹-Tebuconazole / ²-Azoxystrobin

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA