

Custodia®
32 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Int
Zona Franca Barranquilla, Colombia.

1

COC(=O)C1=C(COC2=CC=CC=C2OC2=N3C=CC=CC3=N3)C=C(C)C1
Azoxyrobin

Botellas plásticas de 250 ml y 1 litro



3

Realizar un máximo de aplicaciones por campaña-año con un intervalo entre aplicaciones de 20 días en el cultivo de mango, 15 días en los cultivos de arroz, maíz, mandarina, pimiento y vid (oidiosis); 10 días en alcachofa, cebolla, papa y vid (pudrición gris); 10 - 15 días en espárrago y 30 días en café.

Realizar las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad o se presenten los primeros síntomas.

Café.- Aplicar durante las etapas de desarrollo y llenado de frutos.

Cebolla (Mancha foliar).- Aplicar durante las etapas de desarrollo y llenado de bulbos.

Mandarina (Alternaria).- Aplicar durante la etapa de floración y a inicios de fructificación.

4

5

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 300 mm x 105 mm