

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o farraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto bájese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Trasladar a la personas al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Custodia®

32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Tebuconazole 200 g/l
 Azoxystrobin 120 g/l
 1,2-benzisotiazolin-3-one 0.4 g/l
 Aditivos c.s.p. 1 Litro.

Reg. PQUA N° 675- SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of. N° 306.
 Santiago de Surco - Perú.
 Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
 Calle 1C N° 7-53 Interior Zona Franca.
 Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: **1 LITRO**
 N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



ADAMA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estados iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.5	-	7	0.6/5.0*
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				
Arroz	Quemado del Arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5 - 0.7	-	35	2.0/5.0
Café	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.3	30	0.1/0.03
	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	-	14	0.15/1.0
Cebolla	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	-	14	0.15/1.0
	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.6	-	20	0.02/0.01
Espárrago	Oídiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.20 - 0.25	5	0.1/10
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.25 - 0.30	15	0.6/0.02
Maíz	Mancha del Asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	-	0.2 - 0.3	15	0.6/0.02
Mandarina	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2	15	5.0/15.0
	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	-	0.15 - 0.2	52	0.05/0.7
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.15 - 0.25	3	1/2
Melocotonero	Oídiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	-	0.15 - 0.20	15	0.02/7.0
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5 - 0.7	-	7	1.0/3.0
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.75 - 1.0	-	14	6.0/2.0
	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	-	7	1.0/3.0
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5 - 0.6	0.083 - 0.1	14	6.0/2.0
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	0.18 - 0.24		

PC.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
 1-Tebuconazole/2 - Azoxystrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año en todos los cultivos recomendados en el cuadro de usos. Ver información sobre intervalo entre aplicaciones y momento de aplicación en la hoja informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO; COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Dimensiones: 288 mm x 140 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA