

ADAMA

Custodia®

32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICA DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Tebuconazole 200 g/L
 Azoxystrobin 120 g/L
 1,2-benzisotiazolin-3-one 0.4 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° 675 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
 Miraflores. Lima - Perú.
 Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
 Calle 1C N° 7-53 Interior Zona Franca.
 Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: **5 LITROS**

Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
 CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estadios iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.5	-	7	0.6 / 5.0 ²
	Pudrición gris	Botrytis cinerea				
Arroz	Quemado del Arroz	Pyricularia oryzae	0.5 - 0.7	-	35	2.0 / 5.0
Café	Roya del café	Hemileia vastatrix	-	0.3	30	0.1 / 0.02
Cebolla	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.5	-	14	0.1 / 1.0
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	0.4	-	-	-
Espárrago	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.6	-	nd	0.05 / 0.01
Fresa	Oídiosis	Oidium sp.	-	0.20-0.25	5	0.1 / 10
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.25-0.30	-	-
Maíz	Mancha del Asfalto	Phyllachora maydis	-	0.2 - 0.3	15	0.6 / 0.02
Mandarina	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.2	nd	5.0 / 15.0
Mango	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	-	0.15 - 0.25	nd	0.05 / 0.7
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.5 - 0.7	-	nd	0.02 / 1.0
Pimiento	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.6	-	7	1.0 / 3.0
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	0.5	-	14	6.0 / 2.0
	Pudrición gris	Botrytis cinerea				

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón) nd: no determinado
 1-Tebuconazole / 2 - Azoxystrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña-año. Ver información de sobre intervalo entre aplicaciones en la hoja informativa adjunta. Realizar las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad o se presente los primeros síntomas.

PERIODO DE REINGRESO; COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA