

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Custodia® 32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICA DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Tebuconazole ..... 200 g/L  
Azoxystrobin ..... 120 g/L  
1,2-benzisotiazolin-3-one ..... 0.4 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° 675 - SENASA

Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of. N° 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.**  
Calle 1C N° 7-53 Interior Zona Franca.  
Barranquilla. Colombia.

CONTENIDO NETO: **5 Litros**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. El tratamiento es sintomático.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estadios iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.5	-	7	0.6/5.0'
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	-	-	-
Arroz	Guernado del Arroz	Pyricularia oryzae	0.5 - 0.7	-	35	2.0/5.0
Café	Roya del Café	Hemileia vastatrix	-	0.3	30	0.1/0.03
Cebolla	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.5	-	-	0.15/1.0
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	0.4	-	14	-
Espárrago	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.6	-	20	0.02/0.01
Fresa	Oídiosis	Oidium sp.	-	0.20 - 0.25	5	0.1/10
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.25 - 0.30	-	-
Maíz	Mancha del Asfalto	Phyllosticta maydis	-	0.2 - 0.3	15	0.6/0.02
Mandarina	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.2	15	5.0/15.0
	Alternaria	Alternaria alternata	-	0.15 - 0.2	-	-
Mango	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	-	0.15 - 0.25	52	0.05/0.7
Melocotonero	Oídiosis	Sphaerotheca pannosa	-	0.15 - 0.20	3	1/2
	Tizón temprano	Alternaria solani	0.5 - 0.7	-	15	0.02/7.0
Papa	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.75 - 1.0	-	-	-
	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.6	-	7	1.0/3.0
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	0.5 - 0.6	0.085 - 0.1	14	6.0/2.0
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	0.5	0.18 - 0.24	-	-

PC.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)  
1-Tebuconazole/2 - Azoxystrobin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Dos (02) aplicaciones por campaña y una (01) campaña al año en los cultivos de alcachofa, arroz, café, cebolla, espárrago, fresa, maíz, mandarina, mango, melocotonero, papa, pimiento y vid. Ver información sobre intervalo entre aplicaciones y momento de aplicación en la hoja informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA