



153 x 40mm

Score[®] 250 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICION:

Difenoconazole 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 326 – SENASA

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

100 mL



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Importado y Distribuido por:

Tecnología Química y Comercio S.A. **TQC**

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. **syngenta**[®]

Sucursal del Perú

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

L1096909 4157235 PEQ_01B




774 x 40mm

COMPATIBILIDAD En principio Score® 250 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.		RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.		<table><tr><th rowspan="2">CULTIVO</th><th colspan="2">CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO</th><th rowspan="2">P.C. (días)</th><th rowspan="2">L.M.R. (PPm)</th></tr><tr><th>ENFERMEDADES</th><th>DOSIS</th></tr><tr><th></th><th>NOMBRE COMUN</th><th>NOMBRE CIENTIFICO</th><th>mL / ha</th><th>mL / 200 L</th></tr><tr><td rowspan="2">Aji páprika</td><td>Oidium</td><td><i>Leveillula taurica</i></td><td>250-375</td><td>100-150</td></tr><tr><td>Alternariosis</td><td><i>Alternaria spp.</i></td><td>300-375</td><td>200-250</td></tr><tr><td>Ajo</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternada porri</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Alcachofa</td><td>Oidium</td><td><i>Leveillula taurica</i></td><td>250-375</td><td>100-150</td></tr><tr><td>Apio</td><td>Mancha foliar</td><td><i>Cercospora apiicola</i></td><td>150-200</td><td>21</td></tr><tr><td>Arándano</td><td>Roya</td><td><i>Thekopsora minima</i></td><td>500-600</td><td>1</td></tr><tr><td>Arveja</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe betae</i></td><td>150-200</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="2">Arroz</td><td>Quemado del arroz</td><td><i>Pyricularia grisea</i></td><td>200-300</td><td>25</td></tr><tr><td>Rhizoctoniasis</td><td><i>Rhizoctonia solani</i></td><td>200-300</td><td>25</td></tr><tr><td rowspan="2">Cebolla</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternada porri</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Tizón foliar</td><td><i>Stemphylium vesicarium</i></td><td>200-250</td><td>7</td></tr></table>		CULTIVO	CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)	ENFERMEDADES	DOSIS		NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L	Aji páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250-375	100-150	Alternariosis	<i>Alternaria spp.</i>	300-375	200-250	Ajo	Alternaria	<i>Alternada porri</i>	150-200	7	Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250-375	100-150	Apio	Mancha foliar	<i>Cercospora apiicola</i>	150-200	21	Arándano	Roya	<i>Thekopsora minima</i>	500-600	1	Arveja	Oidium	<i>Erysiphe betae</i>	150-200	14	Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia grisea</i>	200-300	25	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200-300	25	Cebolla	Alternaria	<i>Alternada porri</i>	150-200	7	Tizón foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200-250	7	<table><tr><th rowspan="2">CULTIVO</th><th colspan="2">ENFERMEDADES</th><th rowspan="2">P.C. (días)</th><th rowspan="2">L.M.R. (PPm)</th></tr><tr><th>NOMBRE COMUN</th><th>NOMBRE CIENTIFICO</th><th>mL / ha</th><th>mL / 200 L</th></tr><tr><td>Clavel</td><td>Roya</td><td><i>Uromyces dianthi</i></td><td>NA</td><td>20</td></tr><tr><td>Col</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe polygoni</i></td><td>21</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Granada</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternaria alternata</i></td><td>500-600</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="3">Espárrago</td><td>Roya</td><td><i>Puccinia asparagi</i></td><td rowspan="3">350-500</td><td rowspan="3">30</td></tr><tr><td>Cercosporiosis</td><td><i>Cercospora asparagi</i></td></tr><tr><td>Mancha purpura</td><td><i>Stemphylium vesicarium</i></td></tr><tr><td rowspan="2">Frijol</td><td>Roya</td><td><i>Uromyces appendiculatus</i></td><td rowspan="2">150-200</td><td rowspan="2">14</td></tr><tr><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe polygoni</i></td></tr><tr><td>Mango</td><td>Antracnosis</td><td><i>Colletotrichum gloeosporioides</i></td><td>125</td><td>14</td></tr><tr><td>Manzano</td><td>Oidium</td><td><i>Podosphaera leucotricha</i></td><td>80</td><td>14</td></tr><tr><td>Marigold</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternaria sp.</i></td><td>150-200</td><td>30</td></tr><tr><td>Melón</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe cichoracearum</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr></table>		CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L	Clavel	Roya	<i>Uromyces dianthi</i>	NA	20	Col	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	21	0.2	Granada	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	500-600	14	Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	350-500	30	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	125	14	Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	80	14	Marigold	Alternaria	<i>Alternaria sp.</i>	150-200	30	Melón	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7	<table><tr><th rowspan="2">CULTIVO</th><th colspan="2">ENFERMEDADES</th><th rowspan="2">P.C. (días)</th><th rowspan="2">L.M.R. (PPm)</th></tr><tr><th>NOMBRE COMUN</th><th>NOMBRE CIENTIFICO</th><th>mL / ha</th><th>mL / 200 L</th></tr><tr><td>Rosa</td><td>Oidium</td><td><i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i></td><td>200-300</td><td>NA</td></tr><tr><td>Sandía</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe cichoracearum</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Tomate</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternaria solani</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Vainita</td><td>Roya</td><td><i>Uromyces appendiculatus</i></td><td>150-200</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="2">Vid</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe polygoni</i></td><td rowspan="2">50-100(1) 150 - 200 (2)</td><td rowspan="2">28</td></tr><tr><td>Oidium</td><td><i>Uncinula necator</i></td></tr><tr><td>Zapallo</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe cichoracearum</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr></table> (1) En variedades sin pepa (2) En variedades con pepa PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.		CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L	Rosa	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i>	200-300	NA	Sandía	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7	Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	150-200	7	Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14	Vid	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	50-100(1) 150 - 200 (2)	28	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7	<table><tr><th rowspan="2">CULTIVO</th><th colspan="2">ENFERMEDADES</th><th rowspan="2">P.C. (días)</th><th rowspan="2">L.M.R. (PPm)</th></tr><tr><th>NOMBRE COMUN</th><th>NOMBRE CIENTIFICO</th><th>mL / ha</th><th>mL / 200 L</th></tr><tr><td>Rosa</td><td>Oidium</td><td><i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i></td><td>200-300</td><td>NA</td></tr><tr><td>Sandía</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe cichoracearum</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Tomate</td><td>Alternaria</td><td><i>Alternaria solani</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr><tr><td>Vainita</td><td>Roya</td><td><i>Uromyces appendiculatus</i></td><td>150-200</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="2">Vid</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe polygoni</i></td><td rowspan="2">50-100(1) 150 - 200 (2)</td><td rowspan="2">28</td></tr><tr><td>Oidium</td><td><i>Uncinula necator</i></td></tr><tr><td>Zapallo</td><td>Oidium</td><td><i>Erysiphe cichoracearum</i></td><td>150-200</td><td>7</td></tr></table> (1) En variedades sin pepa (2) En variedades con pepa PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.		CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L	Rosa	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i>	200-300	NA	Sandía	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7	Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	150-200	7	Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14	Vid	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	50-100(1) 150 - 200 (2)	28	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7	“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” Importado y Distribuido por: Tecnología Química y Comercio S.A. syngenta® Titular del Registro: Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847. RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. L1096909 4157235 PEQ_01B	
CULTIVO	CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)																																																																																																																																																																																																																							
	ENFERMEDADES	DOSIS																																																																																																																																																																																																																									
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L																																																																																																																																																																																																																							
Aji páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250-375	100-150																																																																																																																																																																																																																							
	Alternariosis	<i>Alternaria spp.</i>	300-375	200-250																																																																																																																																																																																																																							
Ajo	Alternaria	<i>Alternada porri</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250-375	100-150																																																																																																																																																																																																																							
Apio	Mancha foliar	<i>Cercospora apiicola</i>	150-200	21																																																																																																																																																																																																																							
Arándano	Roya	<i>Thekopsora minima</i>	500-600	1																																																																																																																																																																																																																							
Arveja	Oidium	<i>Erysiphe betae</i>	150-200	14																																																																																																																																																																																																																							
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia grisea</i>	200-300	25																																																																																																																																																																																																																							
	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200-300	25																																																																																																																																																																																																																							
Cebolla	Alternaria	<i>Alternada porri</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
	Tizón foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200-250	7																																																																																																																																																																																																																							
CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)																																																																																																																																																																																																																							
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			mL / ha	mL / 200 L																																																																																																																																																																																																																					
Clavel	Roya	<i>Uromyces dianthi</i>	NA	20																																																																																																																																																																																																																							
Col	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	21	0.2																																																																																																																																																																																																																							
Granada	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	500-600	14																																																																																																																																																																																																																							
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	350-500	30																																																																																																																																																																																																																							
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>																																																																																																																																																																																																																									
	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>																																																																																																																																																																																																																									
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14																																																																																																																																																																																																																							
	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>																																																																																																																																																																																																																									
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	125	14																																																																																																																																																																																																																							
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	80	14																																																																																																																																																																																																																							
Marigold	Alternaria	<i>Alternaria sp.</i>	150-200	30																																																																																																																																																																																																																							
Melón	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)																																																																																																																																																																																																																							
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			mL / ha	mL / 200 L																																																																																																																																																																																																																					
Rosa	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i>	200-300	NA																																																																																																																																																																																																																							
Sandía	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14																																																																																																																																																																																																																							
Vid	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	50-100(1) 150 - 200 (2)	28																																																																																																																																																																																																																							
	Oidium	<i>Uncinula necator</i>																																																																																																																																																																																																																									
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
CULTIVO	ENFERMEDADES		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)																																																																																																																																																																																																																							
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			mL / ha	mL / 200 L																																																																																																																																																																																																																					
Rosa	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i>	200-300	NA																																																																																																																																																																																																																							
Sandía	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							
Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	150-200	14																																																																																																																																																																																																																							
Vid	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>	50-100(1) 150 - 200 (2)	28																																																																																																																																																																																																																							
	Oidium	<i>Uncinula necator</i>																																																																																																																																																																																																																									
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	150-200	7																																																																																																																																																																																																																							

Score[®] 250 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA - TRIAZOL
Concentrado Emulsionable - EC

Nombre Común (ISO): Difenconazole 250 gramos de i.a. por litro de producto formulado a 20 °C
Nombre Químico (IUPAC): cis - trans - 3 - chloro - 4 - [4 - methyl - 2 - (1H -1,2,4 - triazole -1- ylmethyl)- 1,3 - dioxolan - 2 -yl] phenyl 4 - chlorophenyl ether
Peso Molecular: 406.3 g/mol



Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal del Perú Manuel Olguín 335, Of. 808,
Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima - Perú
RUC 20501511740
Importado y Distribuido por:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981



Formulado por
Syngenta S.A.
Cartagena - Colombia



NO EXPLOSIVO - INFLAMABLE - NO CORROSIVO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Durante la mezcla: Utilizar delantal de goma, tapaboca, careta de protección y guantes de nitrilo o neopreno.
- Durante la aplicación: Utilizar sombrero, overol de algodón, tapaboca, botas de goma y guantes de nitrilo o neopreno.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INDICACIONES GENERALES

- **Score[®] 250 EC** es un fungicida que pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol.
- **Score[®] 250 EC** posee acción sistémica y de transaminar que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
- Repetir los pasos b) al d) tres veces.
- Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INDICACIONES GENERALES

- **Score[®] 250 EC** es un fungicida que pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol.
- **Score[®] 250 EC** posee acción sistémica y de transaminar que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- **Score[®] 250 EC** debe ser aplicado previamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma. Para arándanos considerar un intervalo de 14 días, realizar la aplicación en desarrollo vegetativo (hojas y brotes).