VACOMIL -PLUS 50®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Metalaxyl.....150 g/kg
Oxicloruro de cobre..... 350 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Registro Nº 994 - 2001 - AG - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: **NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing.
China.

Importado, Envasado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **500 g**

F. de Form.:
Nº Lote:
F. de Venc.:

Silvestre
Protección Vegetal

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

VACOMIL-PLUS 50® es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones básicas:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico Metalaxyl: Phenylamide: acylalanine.
Grupo Químico Oxicloruro de Cobre: Inorgánico.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos dos días después de realizada la aplicación.
- Peligroso para los peces; no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No arrojar restos de la aplicación o sobrantes del producto, ni lavar el equipo o ropa utilizada en la aplicación en lugares cercanos a fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VACOMIL-PLUS 50® es un fungicida sistémico de formulación polvo mojable compuesto por dos ingredientes activos oxicloruro de cobre (fungicida de contacto) y metalaxyl (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protectivo y curativo. Se recomienda usar **VACOMIL-PLUS 50®** para el control de hongos endoparásitos (oomycetos) causantes de enfermedades en plantas cultivadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad en el cultivo y si las condiciones son de alta humedad en el suelo.
- Se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
- Hacer una segunda aplicación 10 - 14 días después de la primera; sin embargo, si la incidencia del hongo es alta y las condiciones climáticas son frías realizar la segunda aplicación entre 7 y 10 días después.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

VACOMIL-PLUS 50® se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje, suelo o cuello de planta según la plaga a controlar, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

VACOMIL-PLUS 50® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; a excepción de los mercuriales, thiram, cal, azufre, dithiocarbamatos, agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

VACOMIL-PLUS 50® no es fitotóxico para los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
ALCACHOFA	"Mildiu"	*Bremia lactucae*	0.5	1.0	15	0.05
CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	0.35 - 0.5	0.7 - 1.0	15	0.5
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	*Phytophthora nicotianae*	1.0	-	7	0.05
PALTO	"Pudrición radicular"	*Phytophthora cinnamomi*	1.0 - 2.0	-	Nd	0.05
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	0.35 - 0.5	0.7 - 1.0	15	0.05
PÁPRIKA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	0.5*	1.0	7	0.05
	"Hielo azul"	*Phytophthora capsici*	0.5*	1.0	7	0.05
PIMIENTO PIQUILLO	"Hielo azul"	*Phytophthora capsici*	0.75**-1.0	1.5 - 2.0	7	0.05
VID	"Mildiu"	*Plasmopara viticola*	-	1.5 - 2.0	66	1 (a) 50 (b)
QUINUA	"Mildiu"	*Peronospora farinosa*	0.50 -1.0	-	14	0.02 (a) 0.02(b)

LMR: Límite Máximo de Residuos * Aplicar dosis de 0.8 kg/200 litros en infestaciones altas **Aplicar dosis de 0.5 kg/200 litros en infestaciones bajas. **PC:** Periodo de Carencia **(a)** metalaxyl **(b)**oxicloruro de cobre.