

30 cm

16 cm

2.4 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**Peligroso si es ingerido.**  
**Peligroso si es inhalado.**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora. Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión. Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. Usar solamente el producto que viene en envases originales. No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Strobilurinas (Pyraclostrobin)  
En caso de inhalación: Mover a la persona a una área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.  
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.  
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.  
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

#### Nota para el médico:

Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

#### TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
No verter los sobrantes del producto en fuentes de agua.  
"Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".  
"Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio".



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de al menos cinco metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en la área tratada".  
El producto debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# DOGMA®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin ..... 250 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

### PQA N° 676 - SENASA

## INTEROC @ CUSTER

#### Titular de Registro,

**Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**

Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

#### Formulador:

**INTEROC S.A.**  
Km. 16.5 vía Daule  
Guayaquil - Ecuador  
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 200L  
Fecha de Vencimiento :

### NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



## MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**DOGMA®** es un fungicida con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

**DOGMA®** se aplica en solución con agua. Se calcula la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Se coloca en el tanque de mezcla la mitad del agua a emplear, se adiciona la cantidad de **DOGMA®** de acuerdo a la dosis recomendada y se agita. Finalmente se agrega el resto de agua y se agita hasta obtener una mezcla homogénea. **DOGMA®** se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                           | ENFERMEDAD                          |                                   | DOSIS           |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
|                                                   | NOMBRE<br>COMUN                     | NOMBRE<br>CIENTÍFICO              | (L/cil de 200L) | L/Ha      |              |              |
| Cebolla<br>( <i>Allium cepa</i> )                 | "Mildiu de la<br>cebolla"           | <i>Peronospora<br/>destructor</i> | 0.30-0.40       | —         | 7            | 0.2          |
| Espárrago<br>( <i>Asparagus<br/>officinalis</i> ) | "Mancha del<br>peral"               | <i>Stemphylium<br/>vesicarium</i> | —               | 0.40-0.50 | 0            | 0.02         |
| Pimiento<br>( <i>Capsicum annuum</i> )            | "Oidium"                            | <i>Leveillula<br/>taurica</i>     | 0.25            | —         | 7            | 0.5          |
| Fresa<br>( <i>Fragaria vesca</i> )                | "Podredumbre gris"<br>o "Moho gris" | <i>Botrytis<br/>cinerea</i>       | 0.25 - 0.30     | —         | 3            | 1.5          |
| Alcachofa<br>( <i>Cynara scolymus</i> )           | "Oidium"                            | <i>Leveillula<br/>taurica</i>     | 0.20 - 0.25     |           | 3            | 2            |

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se puede realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

#### PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad química y biológica de los productos.

#### FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

