

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SÓLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS
CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Técnico	Nombre Común	mL/200L	L/ha		
Ríos	Schistocerca migratoria	Langosta migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	Omiodes indicata	Pegador de las hojas	400-600	-	21	0.05
Frijol	Crosidosema aporema	Barrenador de los brotes			7	0.1
Maíz	Spodoptera frugiperda	Cogollero			21	0.1
Sorgo	Poccocera atramentalis	Gusano de la panoja	600	-	21	0.4
Papa	Tuta absoluta	Minadora de hojas y tallo			14	0.1
Espárrago	Prodioplosis longifila	Barrenador de brotes	700	1.4	7	0.05
Pimiento	Spodoptera eridania	Gusano ejército	500-600	1.0-1.2	14	0.05
	Symmestrichema capsicum	Perforador de los frutos				
	Prodioplosis longifila	Mosquilla de los brotes	500	1.0		
	Feltia experta	Gusano de tierra				
Tomate	Diabrotica decolor	Escarabajo de las hojas	400-600	-	14	0.1
Mandarina	Selenaspidus articulatus	Queresa redonda	500	3.7	21	1.0
Palto	Fiorinia fioriniae	Queresa del palto	500	2.5	7	0.05

N.D.: No determinado P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando haya alta radiación solar. Nunca aplicar en época de floración.

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida de contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: BENZOMIL® 500 no es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCEIVAS: Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Mochila de espalda, las que se calibran determinando el gasto de agua en un área definida. Del mismo modo se procede en otros equipos de aplicación.

PERIODO DE REENTRADA:24 horas.

PERIODO DE CARENCIA: 21 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Fenkil®
500 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 500 g/L
Naphth..... 420 g/L
Inertes..... c.s.p. 1 L

Nombre común (ISO) : Phenthoate
Nombre químico (IUPAC) : S-α-ethoxycarbonylbenzyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
Fórmula estructural :



Fórmula empírica: : C₁₂H₁₈O₂PS₂
Peso molecular: : 320.3
Grupo químico : Organofosforado
Propiedades físicas y químicas
Apariencia: : Líquido incoloro
Acidez: : 5.5
Densidad: : 1.226 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 0.25, 0.50 y 1.00 L, en envases de PEHD

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del Registro: **NEO AGRUM S.A.C.**
Reg. N° 237- 96 AG-SENASA

Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD
21 Jiangxia St. Ningbo 315000
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Importado y distribuido por:

neogrum

Calle Melitón Porras N° 392 – Miraflores
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gafas, etc.).
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Equipo de protección personal: para las personas encargadas de la preparación, mezcla y los aplicadores, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.
- Usar guantes resistentes a sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o máscara.
- Durante la mezcla o carga, un delantal resistente a sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.
- No dar de beber nada ni induzca el vomito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.
- En caso de emergencia llamar a:

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400
CISPROQUIM: 0800-50-847 ALOESSALUD: 0801-20200(Gratuito)

- Nota al médico: Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación con sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha		
Zapallo	Oidium	Erysiphe cichoracearum	0.2	0.4	7	2
	Chupadera fungosa	Fusarium oxysporum	0.2-0.3	0.4-0.6	n.d.	0.1
Udi	Muerte Regresiva	Lesitiophloe theobromae	-	3.0	15	0.3
P.C.: Período de vacancia			L.M.R.: Límite máximo de residuos		n.d. = No determinado	

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Técnico	
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	3.5-4 g/kg o 150gr/quintal de semilla
	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	2-4 g/100 kg de semilla *
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200 g/200 l. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego lavado a la sombra.

* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.