

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y agitación.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante la manipulación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: **Organofosorado**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040    **ESSALUD** 0801-10200  
CISPROQUIM: 0800-50847    **NEO AGRUM SAC:** 617-6400

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento debe constar de lavado gástrico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación con sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, **no aplicar en época de floración.**
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

# Fenkil®

## 500 EC

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Phenthoate..... 500 g/L  
Naphtha..... 420 g/L  
Inertes.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA  
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y Distribuido por:



Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

N° de Lote:  
F. de Form.:

F. de Venc.:  
**Contenido neto: 500 ml**

Formulado por:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FENKIL 500 EC** es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre científico	Nombre Común	mL/200 L	L/ha		
Ríos	<i>Schistocerca migratoria</i>	Langosta migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	<i>Omiodes indicata</i>	Pegador de las hojas	-	-	21	0.05
Frijol	<i>Crosidosema aporema</i>	Barrenador de los brotes	400 - 600	-	7	0.1
Maiz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	-	-	21	0.1
	<i>Pococera atramentalis</i>	Gusano de la paja			21	0.4
Papa	<i>Tuta absoluta</i>	Minadora de hojas y tallos	600	-	14	0.1
Espárrago	<i>Prodiplosis longitilla</i>	Barrenador de brotes	700	1.4	7	0.05
	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano ejército	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
Pimiento	<i>Symmetrichema capsicum</i>	Perforador de los frutos				
	<i>Prodiplosis lonitilla</i>	Mosquilla de los brotes				
	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	500	1.0		
Tomate	<i>Diabrotica decolor</i>	Escarabajo de las hojas	400 - 600	-	14	0.1
Mandarina	<i>Selenaspisidus articulatus</i>	Queresa redonda	500	3.7	21	1.0
Palto	<i>Florinia florinae</i>	Queresa del palto	500	2.5	7	0.05

PC: Periodo de Carenia    LMR: Límites máximos de residuos    ND: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando haya alta radiación solar. **Nunca aplicar en época de floración.**

En el control de *Schistocerca migratoria* la aplicación es esporádica y a la aparición de la plaga. Máximo aplicar en el cultivo de alfalfa 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de frijol, máximo 2 aplicaciones por año y en los demás cultivos máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** FENKIL 500 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COLORES:(CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES)			COLORES LOGO NEOAGRUM		
NEGRO Texto	PANT.Yellow C Banda Toxicológica	PANT. 287 CVC Nombre Comercial	PANT.343 Verde Oscuro	PANT.377 Verde Claro	PANT.1375 Sol

NEGRO K:100  
PANT.YELLOW Y:100  
PANTONE 287 CVC C:100 M:69 K:11  
PANTONE 343 C:100 M:40 Y:100 K:37  
PANTONE 377 C:30 Y:100 K:30  
PANTONE 1375 M:27 Y:100

VERSIÓN: 12-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-11-12