

22.6 cm

0.9 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y agitación.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante la manipulación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Organofosforado**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50847 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento debe constar de lavado gástrico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación con sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, **no aplicar en época de floración.**
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Fenkil®

500 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 500 g/L
Naphta 420 g/L
Inertes.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 692 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 mL
N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD
Chenjiangang Chemical Park, Xiangshui County
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 500 EC es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua neutra, siendo necesario un ajuste previo del pH. Se recomienda agregar agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada, agitando bien hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceder a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre científico	Nombre Común	mL/200L	L/ha		
Ríos	Schistocerca migratoria	Langosta migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	Omiodes indicata	Pegador de las hojas	400 - 600	-	21	0.05
Frijol	Crosidosema aporema	Barrenador de los brotes			7	0.1
Maíz	Spodoptera frugiperda	Cogollero			21	0.1
Sorgo	Pococera atramentalis	Gusano de la panoja	600	-	21	0.4
Papa	Tuta absoluta	Minadora de hojas y tallos			14	0.1
Espárrago	Prodioplosis longifolia	Barrenador de brotes	700	1.4	7	0.05
Pimiento	Spodoptera eridania	Gusano ejército	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
	Symmetrichema capsicum	Perforador de los frutos				
	Prodioplosis longifolia	Mosquilla de los brotes				
	Feltia experta	Gusano de tierra	500	1.0		
Tomate	Diabrotica decolor	Escarabajo de las hojas	400 - 600	-	14	0.1
Mandarina	Selenaspisidus articulatus	Queresa redonda	500	3.7	21	1.0
Palto	Florinia florinae	Queresa del palto	500	2.5	7	0.05

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Límites máximos de residuos

ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando haya alta radiación solar. **Nunca aplicar en época de floración.**

En el control de *Schistocerca migratoria* la aplicación es esporádica y a la aparición de la plaga. Máximo aplicar en el cultivo de **alfalfa** 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de **frijol**, máximo 2 aplicaciones por año y en los demás cultivos máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: FENKIL 500 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.8 cm