

27.5 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

14.0 ± 0.3 cm

2.1 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo Químico: Organofosforado**
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
 - Nocivo para la fauna benéfica.
 - Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
 - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
 - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Fenkil®
500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Phenthoate.....500 g/L
Naphtha 420 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 692 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.: “Ver parte superior”
F. de Venc.:

Formulado por:
NINGBO AGROSKYRUN TRADING CO., LTD.
Chenjiagang Chemical Park, Xiangshui
County, Yancheng, Jiangsu Pro. CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FENKIL® 500 EC es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.
Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua neutra, siendo necesario un ajuste previo del pH. Se recomienda agregar agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada, agitando bien hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceder a la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	L/ha		
Alfalfa	Pegador de las hojas	<i>Omiodes indicata</i>	400 - 600	-	21	0.05
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	700 - 900	1.4	7	0.05
Frijol	Barrenador de brotes	<i>Crosidosema aporema</i>	400 - 600	-	7	0.1
Granado	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	300 - 500	-	71	0.01
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	400 - 600	-	21	0.1
Mandarina	Queresa redonda	<i>Selenaspidus articulatus</i>	500	3.75	21	1.0
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fiorinae</i>	500	2.5	7	0.05
Papa	Minadora de hojas y tallos	<i>Tuta absoluta</i>	600	-	14	0.1
Pimiento	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
	Gusano Perforador	<i>Symmetrichema capsicum</i>				
	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>				
	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>	500	1.0		
Sorgo	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	400 - 600	-	21	0.4
Tomate	Escarabajo de la hoja	<i>Diabrotica decolor</i>	400 - 600	-	14	0.1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	500 - 600	-	200	0.01

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando haya alta radiación solar. Nunca aplicar en época de floración. Máximo aplicar en el cultivo de alfalfa 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de frijol, máximo 2 aplicaciones por año y en los demás cultivos máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año. Para el cultivo de granado y vid, aplicar en post-cosecha y 1 sola aplicación campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: FENKIL® 500 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aguas carbonatadas y aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.