#### LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto contiene solvente aromático.
- Es irritante moderado para los ojos, la piel y el aparato respitario.
- Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y agitación.
- Utilice ropa y equipo protector durante la manipulación y para ingresar al área tratada en las
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar los envases vacios de este producto para almacenar alimentos ni bebidas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otras envases.
- No almacenar el producto al interior de habitaciones o lugares habitados por personas o animales. Almacenar en producto en lugares frescos y ventilados.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante água y jabón. Evitar el contacto directo con la ropa contaminada, retirarlo del sitio de exposición.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- No tiene antídoto especifico. El tratamiento debe constar de lavado gástrico.

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.



# INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

### COMPOSICIÓN:

Phenthoate	) g/L
Naphta	) g/L
Aditivos	1Ľ

Reg. PQUA N° 692 - SENASA Titular del Registro, Importado y Distribuido por: **NEO AG SAC** 

> Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Nº de Lote: YANCHENG TALHE CHEMICAL CO. LTD. F. de Form. Industrial Zone, Chejiagang, Xiangshui, Yancheng F. de Venc.: Contenido neto: 1 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



## MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

FENKIL 500 EC es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua neutra, siendo necesario un ajuste previo del pH. Se recomienda agregar agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada, agitando bien hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceder a la aplicación.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	TVO PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre científico	Nombre Común	mL/200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Ríos	Schistocerca migratoria	Langosta migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	Omiodes indicata	Pegador de las hojas			21	0.05
Frijol	Crosidosema aporema	Barrenador de los brotes	400 - 600	-	7	0.1
Maíz	Spodoptera frugiperda	Cogollero			21	0.1
Sorgo	Poccocera atramentalis	Gusano de la panoja			21	0.4
Papa	Tuta absoluta	Minadora de hojas y tallos	600	-	14	0.1
Espárrago	Prodiplosis longifila	Barrenador de brotes	700	1.4	7	0.05
	Spodoptera eridania	Gusano ejército				
Pimiento	Symmestrichema capsicum	Perforador de los frutos	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
	Prodiplosis longifila	Mosquilla de los brotes				
	Feltia experta	Gusano de tierra	500	1.0		
Tomate	Diabrotica decolor	Escarabajo de las hojas	400 - 600	-	14	0.1
Mandarina	Selenaspidus articulatus	Queresa redonda	500	3.7	21	1.0
Palto	Fiorinia fioriniae	Queresa del palto	500	2.5	7	0.05

PC: Periodo de Carencia

Formulado por:

Jiangsu Province

LMR: Límites máximos de residuos ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando hava alta radiación solar. Nunca aplicar en época de floración.

En el control de Schistocerca migratoria la aplicación es esporádica y a la aparición de la plaga. Máximo aplicar en el cultivo de alfalfa 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de friiol , máximo 2 aplicaciones por año v en los demás cultivos maíximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de las 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: FENKIL 500 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



























