



Confidor® 70WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable en agua (WG)

Imidacloprid, 700 g/Kg
Aditivos, csp 1 Kg

Reg. : PQUA N° 035-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro

Formulado por:

Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen - Alemania

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú, Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

Lote N°

Fecha de
Formulación:

Fecha de
Vencimiento:

**Contenido
Neto: 50 g**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



PDF CERTIFICADO	Ref. Bolsa 50 g - cara anterior	TINTAS (4)	
Producto: Confidor 70 WG	País: PERÚ	Cian	Negro
Fecha: Julio 16 de 2012	Tamaño: 110mm x 170 mm	Magenta	Amarillo



**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Utilice ropa, máscara y guantes protectores durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación. Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación. No comer, no beber, ni fumar durante la aplicación. Después de la aplicación bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse la ropa y lavar la ropa contaminada. No aplicar en dirección contraria al viento. Uselo en sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado del alcance de los niños y animales domésticos. No se debe almacenar y ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la Etiqueta. Hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo. En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Inducir el vómito sólo si el paciente está consciente. En caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Instrucciones de primeros auxilios: En casos de ingestión oral dar de beber mucha agua (No leche, ni alcohol, ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente. Dar de beber mucho líquido (varios litros en unas horas) para forzar la diuresis. Si se han contaminado los ojos lavar con agua corriente durante por lo menos 15 minutos.

Indicaciones para el médico: Trátase sintomáticamente.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido del envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades

locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No verter el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias). Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos. Peligroso para peces: No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para abejas. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. En caso de derrame recoger el producto con cuidado y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Insecticida sistémico del grupo de los clorinotolinilos. Tiene efecto de contacto estomacal e ingestión. Nuevo modo de acción con alta performance contra poblaciones de insectos resistentes a insecticidas piretroides y fosforados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al estado de plántula y a la presencia de los primeros adultos. No aplicar durante los periodos de floración o si se verifica vuelo de abejas. Se recomienda 1 aplicación drench por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

PRECAUCIÓN: No mezclar con abonos foliares.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado.

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	Kg / ha	%		
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	0.375 - 0.5	--	7	0.5
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	--	n/d	n/d
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	0.05 - 0.06	14	1

* PC = Última aplicación antes de la cosecha (días) ** LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

© = Marca Registrada del grupo Bayer

Bayer



PDF CERTIFICADO	Ref. Bolsa 50 g - cara posterior	TINTAS (2)
Producto: Confidor 70 WG	País: PERÚ	Negro
Fecha: Julio 16 de 2012	Tamaño: 110mm x 170 mm	Amarillo