

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas (máscara, guantes, botas, anteojos).
- Evitar el contacto con los ojos, piel y boca.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de la pulverización.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión eliminar la parte no absorbida, realizar aspiración y lavado gástrico cuidadoso.
- No darle aceite de ricino, leche ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 Opción 4 ó 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Inmediatamente inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aguas con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar un banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para aplicar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TRAPER

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición:

Carbosulfan480 g/L

Aditivosc.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N° 270,
Ate Vitarte

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Fabricado y Formulado por:

 **TRUSCHEM Co. Ltd**
23 rd Floor Golden Eagle
International Plaza, 89
Hanzhong Rd, Nijiang,
210029

Importado y distribuido por:

 **HORTUS®**
ESPECIALISTAS EN SU CAMPO
Calle Sucre 270, Ate Vitarte
Telf: 717-9040 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : **200 L**

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRAPER es un insecticida carbamato en forma de concentrado emulsionable, con amplio espectro de acción. Muy efectivo para el control de insectos barrenadores perforadores y masticadores. **TRAPER**, se puede aplicar con cualquier equipo de aplicación, con el agua suficiente para cubrir en forma uniforme el follaje, ya sea con equipos terrestres o aéreos y manteniendo las dosis recomendadas por hectárea.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN :

TRAPER no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: llene de agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del equipo pulverizador. Agregue la cantidad necesaria de **TRAPER** según la dosis requerida. Agite la mezcla para homogenizar y luego complete el tanque hasta el nivel deseado, usando siempre agua limpia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	P L A G A S		D O S I S		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/ 200 L	L/ha		
Zapallo	Perforador de guías y frutos	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.3 - 0.4	0.56 - 0.75	20	0.5

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

P.C.: Período de Carencia en días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Repetir hasta dos veces por campaña alternando con otros insecticidas de diferente composición química.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero incompatible con compuestos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las especies que se especifican, si se aplican en las condiciones y dosis que se recomiendan.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

