

Custodia®

32 SC


SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Tebuconazole:	250 g/L
Azoxystrobin:	120 g/L
1,2-benzisotiazolin-3-one.....	0.4 g/L
Aditivos:	c.s.p.1 Litro

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Int
Zona Franca Barranquilla, Colombia.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Azoxystrobin: 403.4

Tebuconazole



The chemical structure of Tebuconazole consists of a 1,2,4-triazole ring attached to a 1-phenylbutan-1-ol chain. The phenyl ring has a chlorine substituent at the para position. The butan-1-ol chain has a methyl group and a chlorine substituent at the 2-position. The structure is shown with a central carbon atom bonded to a phenyl ring, a hydroxyl group (HO), a methyl group (H3C), and a 1-(4-chlorophenyl)butan-1-yl group.

COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2OC2c3ncnc3Oc4ccccc4C#N)OC1

Azoxystrobin

NO CORROSIVO NO INFLA

NO EXPLOSIVO

Botellas plásticas de 250 ml y 1 litro



2

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

En animales de experimentación expuestos a altas dosis agudas de **Custodia 32 SC** no se observaron signos de toxicidad. Causa irritación moderada a los ojos.

- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.



3

1

CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX : 0800- 13040

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



4

Agitar el envase antes de abrir. Llenar el tanque del equipo a la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde de agua e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto en campo mantener siempre en marcha el sistema de agitación. En caso de realizar mezclas en tanque con otros productos, **Custodia 32 SC** deberá estar completamente disperso antes de la adición de otros materiales.

Custodia 32 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización terrestre, sin embargo se recomienda utilizar equipos a motor en el cultivo de arroz y plantas grandes de pimiento para asegurar una buena cobertura, en el tercio inferior y medio de las plantas. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub-dosificaciones del producto. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.

Azoxystrobin : Inhibe el ciclo de la respiración mitocondrial en el hongo al bloquear la síntesis de energía (ATP).

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, presenta prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por mas tiempo.

Cebolla .- Aplicar durante las etapas de desarrollo y llenado de bulbos.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

5

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Arroz	Quemado del Arroz	<i>Piricularia oryzae</i>	0.5 - 0.7	-	35	2.0¹ / 5.0²
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3	-	30	0.1 / 0.02
Cebolla	Mancha foliar	<i>Sterophyllum vesicarium</i>	-	0.5	14	0.1 / 1.0
Espárrago	Mancha foliar	<i>Sterophyllum vesicarium</i>	-	0.6	nd	0.05 / 0.01
Maíz	Mancha del Asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	-	0.2 - 0.3	15	0.6 / 0.02
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.15 - 0.25	nd	0.05 / 0.07
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	-	7	1.0 / 3.0
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	-	14	6.0 / 2.0
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				

Utilizar la dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estados iniciales de la enfermedad. alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



6

Dimensiones: 300 mm x 105 mm