

Custodia®
32 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	250 g/L
Axoxystrobin	120 g/L
1,2-benzisotiazolin-3-one.....	0.4 g/L
Aditivos	c.s.p.1 Litro

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000



1

COC(=O)C1=C(C(OC)=C1)Oc2ncnc2Oc3ccccc3C#N

Azoxystrobin

Botellas plásticas de 250 ml y 1 litro



2

- Grupo químico: Triazol + Estrobilurina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.



3

Agitar el envase antes de abrir. Llenar el tanque del equipo a la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde de agua e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto en campo mantener siempre en marcha el sistema de agitación. En caso de realizar mezclas en tanque con otros productos, **Custodia 32 SC** deberá estar completamente disperso antes de la adición de otros materiales.



4

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

5

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (dias)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.5	-	7	0.6 ¹ / 5.0 ²
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				
Arroz	Quemado del Arroz	<i>Pylularia oryzae</i>	0.5 - 0.7	-	35	2.0 / 5.0
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.3	30	0.1 / 0.02
Cebolla	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	-	14	0.1 / 1.0
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	-		
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.6	-	nd	0.05 / 0.01
	Oidiois	<i>Oidium sp.</i>	-	0.20-0.25	5	0.1 / 10
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.25-0.30		
Maíz	Mancha del Asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	-	0.2 - 0.3	15	0.6 / 0.02
Mandarina	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2	nd	5.0 / 15.0
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.15 - 0.25	nd	0.05 / 0.7
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5 - 0.7	-	nd	0.02 / 1.0
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	-	7	1.0 / 3.0
	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>				
Vid			0.5	-	14	6.0 / 2.0
	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>				

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



6

Dimensiones: 300 mm x 105 mm