

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente.
Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta
etiqueta y la hoja informativa adjunta.



**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD 113**
CICOTOX: (01) 328 – 7700
ESSALUD: (01) 411 – 8000, opción 4
INTEROC S.A. (511) 614-5100

PE-SPIRA-V01-24

Spiral®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
SPIRODICLOFEN 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 599 - SENASA

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL Co. Ltd.,
 Nanjing Economic & Technology
 Development
 Zone - China

Contenido Neto: 250 ml
 No. de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



INTEROC

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	(ml/cil de 200L)	%		
Palto <i>Persea americana</i>	Acaro	<i>Oligonychus puniceae</i>	40 - 60	-	2	1.5
Mandarina <i>Citrus reticulata</i>	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	60	-	14	0.4
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	80 - 100	-	14	0.4
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Acaro	<i>Colomerus vitis</i>	40 - 50	0.020 - 0.025	14	2
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.040	14	2

PC: Periodo de Carenia **LMR:** Limite Máximo de Residuos
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS
DESTINO.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

