

Caja Cartón

15 cm

16 cm

# BENZOMIL<sup>®</sup> 500

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**  
Benomyl ..... 500 g/kg  
Aditivos c.s.p. .... 1 kg

Reg. PQUA N° 700 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg  
N° de Lote: .....  
F. de Form.: .....  
F. de Venc.: .....  
Formulado por  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD.  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,  
Zhejiang Province,  
CHINA

NO CORROSIVO                      NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
- Tóxico por ingestión hasta el ingerido.  
- Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias; no aspirar el polvo de la aspiración, usar el equipo de protección respiratoria.  
- Causa irritación moderada a los ojos, usar equipo de protección ocular (gafas).  
- El contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.  
- Es ligeramente irritante a la piel.  
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.  
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
- No almacenar en casa o dentro de la habitación.  
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferroses.  
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.  
- No debe transportarse con productos de consumo humano.  
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
- No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases.  
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
- Grupo Químico: Benzimidazole  
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.  
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.  
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.  
- No dar de beber nada ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.  
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.  
- En caso de emergencia llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3240                      NEO AGRUM SAC: 617-6400  
CISPROQUIM: 0800-04-847                      ALOESSALUD:  
0891-22020(Gratis)

**MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:**  
- Nota al médico: No lavar artículo estético. Tratamiento cosmético.  
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado titulado o perforado y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".  
- "Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.  
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.  
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.  
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**BENZOMIL 500** es un fungicida preventivo y curativo de acción sistémica, efectivo contra un amplio rango de hongos que afectan diversos cultivos de campo. Puede usarse en pulverizaciones a toda la planta, también en pre y post cosecha o en tratamientos de inmersión de semilla de papa y desinfección de semillas.

**PREPARACIÓN:** Llene hasta la mitad del recipiente con agua y agregue la dosis recomendada complete con agua agitando constantemente.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Como preventivo por impregnación de semilla antes de la siembra en aplicaciones foliares cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del hongo. Como curativo ante la infección de las plantas por el hongo.

Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año para aplicaciones foliares en el cultivo de zapallo con intervalos de aplicación de 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
No reingrese al campo antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha		
Zapallo	Oidium	Erysiphe dichoracearum	0.2	0.4	7	2
Espirago	Chupadera fungosa	Fusarium oxysporum	0.2 - 0.3	0.4 - 0.6	n.d.	0.1
Vid	Muerte Regresiva	Lasiodiplodia theobromae	-	3.0	15	0.3

P.C.: Período de carencia                      L.M.R.: Límite máximo de residuos                      n.d.: No determinado

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Técnico	
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	3.5 - 4 g/litro ó 165g/cuarenta de semilla
Papa	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	3 - 4 g por kg de semilla
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200 g/200 l. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego tenerla a la sombra.

\* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.



VERSIÓN: TRANSFERENCIA  
ULTIMA REVISIÓN: 14/05/13

23.5 cm