

23.5 cm

Caja Cartón

16 cm

15 cm

BENZOMIL[®] 500

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Benomyl 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 700 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg
N° de Lote: SINOCHEN NINGBO IMP & EXP CO. LTD.
F. de Form.: 21 Jiangxia St. Ningbo 315000.
F. de Venc.: CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Toco por ingestión hasta el ingreso.
- Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias; no aspirar el polvo de la aspiración, usar el equipo de protección respiratoria.
- Causa irritación moderada a los ojos, usar equipo de protección ocular (gafas).
- El contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.
- Es ligeramente irritante a la piel.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casa o dentro de la habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferros.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Benzimidazole
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.
- No dar de beber nada ni inducir el vomito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.
- En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3240 NEO AGRUM SAC: 617-6400
CISPROQUIM: 0800-04-847 ALOESSALUD: 0891-22020(Gratis)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:
- Nota al médico: No lavar envases vacíos. Tratamiento sanitario.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multiplique titulándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".
- "Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha		
Zapallo	Oidium	Erysiphe dichoracearum	0.2	0.4	7	2
Espirago	Chupadera fungosa	Fusarium oxysporum	0.2 - 0.3	0.4 - 0.6	n.d.	0.1
Vid	Muerte Regresiva	Lasiodiplodia theobromae	-	3.0	15	0.3

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos n.d.: No determinado

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Técnico	
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	3.5 - 4 g/litro o 165g/cuarenta de semilla
Papa	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	3 - 4 g por kg de semilla
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200 g/200 l. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego tenerla a la sombra.

* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.



VERSIÓN: TRANSFERENCIA
ULTIMA REVISIÓN: 14/05/13