

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SÓLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS
CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200L	kg / ha		
Espárrago	Chupadera fungosa	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2 - 0.3	0.4 - 0.6	n.d.	0.1
Vid	Muerte Regresiva	<i>Lasidiopodia theobromae</i>	-	3.0	15	0.3
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.2	0.4	7	2

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

TRATAMIENTO DE SEMILLAS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Técnico	
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3.5 - 4 g/kg ó 165g/quintal de semilla
Frijol	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3 - 4 g por kg de semilla *
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 g/200 l. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego tenerlo a la sombra.

* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Como preventivo por impregnación de semilla antes de la siembra en aplicaciones foliares cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del hongo. Como curativo antes de la infección de las plantas por el hongo.

MODO DE ACCIÓN: Es un fungicida preventivo y curativo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la división celular y el transporte intracelular.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: BENZOMIL® 500 no es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS: Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Mochila de espalda, las que se calibran determinando el gasto de agua en un área definida. Del mismo modo se procede en otros equipos de aplicación.

PERÍODO DE REENTRADA: 24 horas.


PERÍODO DE CARENCIA: 15 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

BENZOMIL®
500

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:	
Benomyl.....	500 g/kg
Aditivos c.s.p.....	1 kg
Nombre común (ISO) : Benomyl	
Nombre químico (IUPAC) : methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate	
Fórmula estructural : 	
Fórmula empírica: : C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₃	
Peso molecular: : 290.3	
Grupo químico : Benzimidazole	
Propiedades físicas y químicas	
Apariencia: : Polvo blanco	
Acidez: : 6 - 8	
Densidad: : 0.38 g/ml	

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 0.25, 0.50 y 1.00 L, en envases de PEHD

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.
Reg.PQUA N °700-SENASA

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Importado y distribuido por:

neogrum

Calle Melitón Porras N° 392 – Miraflores
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

