

15 cm

BENZOMIL[®] 500

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benomyl 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 700 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 g

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

22 cm

2.4 cm

15 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias, no aspirar el polvo de la aspersión, usar el equipo de protección respiratoria.
- Causa irritación moderada a los ojos, usar equipo de protección ocular (gafas).
- El contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.
- Es ligeramente irritante a la piel.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casa o dentro de la habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.
- No dar de beber nada ni induzca el vomito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.
- En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
- NEOAGRUM S.A.C.: 617-6400
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENZOMIL 500 es un fungicida preventivo y curativo de acción sistémica, efectivo contra un amplio rango de hongos que afectan diversos cultivos de campo. Puede usarse en pulverizaciones a toda la planta, también en pre y post cosecha o en tratamientos de inmersión de semilla de papa y desinfección de semillas. Llene hasta la mitad del recipiente con agua y agregue la dosis recomendada complete con agua agitando constantemente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Como preventivo por impregnación de semilla antes de la siembra en aplicaciones foliares cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del hongo. Como curativo ante la infección de las plantas por el hongo. Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año para aplicaciones foliares en el cultivo de zapallo con intervalos de aplicación de 15 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingrese al campo antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg /200 L	kg/ha		
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.2	0.4	7	2
Espárrago	Chupadera fungosa	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2 - 0.3	0.4 - 0.6	n.d.	0.1
Vid	Muerte Regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	--	3.0	15	0.3

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

n.d. = No determinado

TRATAMIENTO DE SEMILLAS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Técnico	
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3.5 - 4 g/kg ó 165g/quintal de semilla
Frijol	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3 - 4 g por kg de semilla *
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 g/200 L. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego tenerlo a la sombra.

* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.

