

15 cm

BENZOMIL[®] 500

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benomyl500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 700 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 200 g

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO.,LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

15 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo Químico: Benzimidazole**
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g / 200 L	kg / ha		
Espárrago	Chupadera fungosa	<i>Fusarium oxysporum</i>	200 - 300	0.4 - 0.6	n.d.	0.1
Vid	Muerte Regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	--	3.0	15	0.3
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	0.4	7	2

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

n.d. = No determinado

TRATAMIENTO DE SEMILLAS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Y APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Científico	
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3.5 - 4 g/kg ó 165g/quintal de semilla
Frijol	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	3 - 4 g por kg de semilla *
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 g/200 L. Sumergir por 3 minutos en la solución, luego tenerlo a la sombra.

* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque.

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENZOMIL[®] 500 es un fungicida preventivo y curativo de acción sistémica, efectivo contra un amplio rango de hongos que afectan diversos cultivos de campo. Puede usarse en pulverizaciones a toda la planta, también en pre y post cosecha o en tratamientos de inmersión de semilla de papa y desinfección de semillas. Llène hasta la mitad del recipiente con agua y agregue la dosis recomendada complete con agua agitando constantemente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Como preventivo por impregnación de semilla antes de la siembra en aplicaciones foliares cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del hongo. Como curativo ante la infección de las plantas por el hongo.

Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año para aplicaciones foliares en el cultivo de zapallo con intervalos de aplicación de 15 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

BENZOMIL[®] 500 es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

BENZOMIL[®] 500 no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



22 cm

2.4 cm