

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

**NOTA AL MÉDICO**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

**ACARICIDA BIOLÓGICO  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Matrine.....0.3 %  
Aditivos .....99.7 %

**ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 257 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

EDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA  
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Victor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE O FORMULADOR:**

RUSHAN HANWEI BIOTECH CO. LTD  
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China  
Telef: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

**IMPORTADOR:**



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 1 L  
Fecha de Vencimiento :

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxígeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	<i>Tetranychus urticae</i>	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Exento según EPA

**COMPATIBILIDAD**

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS,  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

**NOTA AL MÉDICO**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

**ACARICIDA BIOLÓGICO  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Matrine.....0.3 %  
Aditivos .....99.7 %

**ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 257 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

EDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA  
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Victor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE O FORMULADOR:**

RUSHAN HANWEI BIOTECH CO. LTD  
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China  
Telef: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

**IMPORTADOR:**



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 5 L  
Fecha de Vencimiento :

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxígeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	<i>Tetranychus urticae</i>	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Exento según EPA

**COMPATIBILIDAD**

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS,  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

**NOTA AL MÉDICO**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

**ACARICIDA BIOLÓGICO  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Matrine.....0.3 %  
Aditivos .....99.7 %

**ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 257 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

EDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA  
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Victor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE O FORMULADOR:**

RUSHAN HANWEI BIOTECH CO. LTD  
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China  
Telef: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

**IMPORTADOR:**



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 20 L  
Fecha de Vencimiento :

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxígeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	<i>Tetranychus urticae</i>	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Exento según EPA

**COMPATIBILIDAD**

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS,  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

**NOTA AL MÉDICO**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

**ACARICIDA BIOLÓGICO  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Matrine.....0.3 %  
Aditivos .....99.7 %

**ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 257 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

EDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA  
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Victor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE O FORMULADOR:**

RUSHAN HANWEI BIOTECH CO. LTD  
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China  
Telef: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

**IMPORTADOR:**



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 25 L  
Fecha de Vencimiento :

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxígeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	<i>Tetranychus urticae</i>	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm  
Exento según EPA

**COMPATIBILIDAD**

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS,  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

**NOTA AL MÉDICO**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

**ACARICIDA BIOLÓGICO  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Matrine.....0.3 %  
Aditivos .....99.7 %

**ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 257 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

EDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA  
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Victor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE O FORMULADOR:**

RUSHAN HANWEI BIOTECH CO. LTD  
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China  
Telef: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

**IMPORTADOR:**



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 200 L  
Fecha de Vencimiento :

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxígeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	<i>Tetranychus urticae</i>	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Exento según EPA

**COMPATIBILIDAD**

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS,  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

