

SOLDIER[®]

25 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:


Tebuconazole.....250 g/L
Aditivos csp 1.0 L

Reg. PQUA N° 305 - SENASA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Formula estructural:



Formula empírica: C₂₄H₂₇ClN₃O
Peso molecular: 307.8

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, Tercer piso, Of. 702,
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 253-6444 / Fax: (01) 271-1988
atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Room 3101, West tower, Fortune International Building,
N° 339 Hongqiao road, Nanjing 210092, China.
Tel.: + 86 - 25 - 84853194
Fax: + 86-25-84658312/3123

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579, Tercer piso, Of. 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 253-6444 / Fax: (01) 271-1988
atencioncliente@grupoandina.com.pe



“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: líquido amarillo con olor característico

Densidad: 1.05 - 1.07 g/ml a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

Corrosividad: No corrosivo

Explosividad: no explosivo



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Moderadamente irritante a la piel y tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles

- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y lleve al paciente al médico; de preferencia al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX: 0- 800 -1 -3040
CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas altas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SOLDIER[®] 25 EC es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	ml/200L		
ESPARRAGO	“Cercospora”	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2-0.4	100-200	15	0.05
CAFÉ	“Roya de café”	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	250	30	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones. Usar agua limpia con pH neutro.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SOLDIER[®] 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

SOLDIER[®] 25 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

SOLDIER[®]

25 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)