

GESATRINA 1L. 28.7 cm. x 15 cm. COEX 03/09/13

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No coma, no beba ni fume durante la mezcla y aplicación.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
No almacene, ni transporte con alimento, medicina, bebidas ni forraje.  
Almacene el producto únicamente en su envase original, etiquetado y cerrado.  
Mantener el producto lejos de todas las fuentes de ignición.  
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazinas  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.  
En caso de ingestión accidental induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente. Realizar lavado gástrico.  
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.  
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si no respira, bríndale respiración artificial.

No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.  
Teléfono de Emergencia Toxicológica:

CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD 0801-10200, CIPROQUIN 080050847, FARMAGRO 6141500

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.  
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.  
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# GESATRINA

## 500 SC

### HERBICIDA AGRÍCOLA

#### Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ametrina ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° .... -SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO S.A.**  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.**  
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China  
Telf.: +86-531-8875230 Fax: +86-531-8875230

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**  
**Número de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**GESATRINA**, es un herbicida a base de Ametryn, el cual es absorbido por las malezas, tanto por la vía foliar como radicular, inhibiendo la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos; usado para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales señalados en la etiqueta. Puede ser usado tanto en pre como en post emergencia.

**GESATRINA**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación. Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO        | MALEZA          |                             | DOSIS<br>L/Ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                | Nombre Común    | Nombre Científico           |               |                |                 |
| Caña de azúcar | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i>      | 3.0           | N.A*           | 0.05            |
|                | Rabo de zorro   | <i>Setaria verticillata</i> |               |                |                 |
|                | Chamico         | <i>Datura stramonium</i>    |               |                |                 |
|                | Verdolaga       | <i>Portulaca oleracea</i>   |               |                |                 |
|                | Amor seco       | <i>Bidens pilosa</i>        |               |                |                 |
|                | Yuyo            | <i>Amaranthus dubius</i>    |               |                |                 |

P.C.: Período de carencia (días) / LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)  
N.A. \*: No aplica, dado que el herbicida se aplica antes o inmediatamente después de la siembra, no se señala ningún intervalo entre el momento de la aplicación y la cosecha. Esta cubierto por el período vegetativo normal entre la aplicación y la cosecha

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicarlo en post emergencia temprana de las malezas y en pre o post emergencia de la caña de azúcar, en caña de azúcar recién plantada o en retoño.  
Es preferible que el producto sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se aplica en mezcla con humectantes o con un herbicida hormonal.  
Se recomienda realizar una aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO:

No permitir el reingreso al campo antes de las 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

**GESATRINA**, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina/ácida.

FITOTOXICIDAD:

**GESATRINA**, no es fitotóxico al cultivo a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físicas- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

