

KUARTEL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinato de Amonio 200 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 706 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO. LTD.**
11 Zitanyaju, 126 Megdu street
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Moderadamente peligroso, evite respirar las aspersiones, use equipo de protección respiratoria.
Ligeramente irritante al tracto respiratorio y vías respiratorias.
Moderadamente irritante a la piel, no exponerse directamente al producto, usar guantes y equipo de protección dermal.
Ligeramente irritante a los ojos.
Tóxico por ingestión, puede ser letal si es ingerido.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Conservese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Phosphonic acid
En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial, si es necesario llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.
En caso de intoxicación por ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
Nota para el médico:
No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). ESSALUD: 411-800 Opción 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/cil de 200L)	(L/Ha)		
Mandarina	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	14	0.1
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>				
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Caña de azúcar	“Gramma dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	—	2.0 - 3.0	60	0.1
Palto	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	1	0.1
Vid	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	—	14	0.1
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Palma aceitera	“Kudzu”	<i>Pueraria phaseoloides</i>	2.0 - 2.5	—	14	0.1
	“Commelina”	<i>Commelina sp</i>				
	“Coquito”	<i>Cyperus sp</i>				

PC: Período de Carencia
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

