

Etiqu. SCUADRA 1L

28,7 x 14,5 cm

COEX-PET

NINGBO

01.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso a las vías respiratorias, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de protección respiratoria.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado y almacenarlo en lugares frescos y ventilados.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas, alimentos, medicinas, agua ni forraje.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilino pirimidine

- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROMQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes, del producto o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
 - En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Aplicar temprano en la mañana o en la tarde, para evitar la deriva por el viento.

SCUADRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)****COMPOSICIÓN:**

Pyrimethanil..... 400 g/L
Aditivos..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 707 - SENASA**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:****FARMAGRO S.A.**

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huarochirí, Lima

Central: (01) 614 1500

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS**Formulador:****NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.**Developing Mansions, Ningbo Bonded Area, Ningbo
CHINA**Fecha de Formulación:****N° de Lote:****Contenido neto: 1L****Fecha de vencimiento:****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCUADRA es un fungicida de contacto con acción traslaminar, que pertenece al grupo de los Anilino pirimidines y que actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **SCUADRA**; agitar continuamente y completar el resto con agua.

Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/Cil	L/ha		
Fresa	Botrytis	Botrytis cinerea	200	0.4	7	2
Patto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	3.0	N/d	0.05
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	21	5
Alcachofa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.5	3	0.01
Pimiento	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	3	2
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	0	7

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm N/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.

- Se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el período de carencia.

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 2 campañas/año.

- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: Después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

