

ATRAMET COMBI 50 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición química:

Ametryn	250 g/L
Atrazine	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg N°: 287-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
 **Proficol**
PROFIANDINA PERÚ S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555. Of. 404. Miraflores.
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000 / 255-7190.

Formulado por:
PROFICOL ANDINA
B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1 C N° 7-53 Interior Zona Franca.
Barranquilla - Colombia

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO : 4 LITROS

Lote N°
F. Formulación:
F. Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto es irritante para los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación; y para reingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de aplicado el producto.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828;
CICOTOX : 0800- 13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- No utilizar el envase para conservar alimentos o agua potable.



PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

USOS ESPECÍFICOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSES (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo (<i>Amaranthus</i> spp.), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Moco de pavo (<i>Echinochloa</i> spp.), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Lechera (<i>Portulaca oleracea</i>), Rabo de zorro (<i>Setaria</i> spp.), Altamiza (<i>Ambrosia</i> spp.), Cardillo (<i>Cenchrus echinatus</i>), Sonajita (<i>Crotalaria incana</i>), Chamico (<i>Datura</i>)	4 - 5	PRE-POST	0.05

P.C.: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO:

ATRAMET COMBI 50 SC es un herbicida selectivo utilizado en pre y post emergencia temprana de malezas anuales monocotiledoneas y dicotiledoneas. Constituido por dos ingredientes activos: atrazina + ametrina, proporciona un mayor espectro de control y un efecto residual más prolongado que cuando cada uno actúa separadamente.

ATRAMET COMBI 50 SC es absorbido a través de las hojas y las raíces; y traslocado a través del xilema al meristema apical donde se acumula. **ATRAMET COMBI 50 SC** inhibe la fotosíntesis causando clorosis seguida por la muerte de la planta.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Agitar el envase antes de preparar la suspensión. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde de agua e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación. **ATRAMET COMBI 50 SC** puede ser aplicado con pulverizadoras de mochila o con equipos montados a tractor, utilizando un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea. Utilizar boquillas de abanico plano. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida es esencial la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe regar después de la aplicación del producto.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Nº máximo de aplicaciones por campaña: 2
 Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2-4 hojas) de la malezas.
 No aplicar una vez que el campo se ha cerrado.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada, sin ropa de protección, después de 12 horas de haber aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD:

ATRAMET COMBI 50 SC es un herbicida selectivo, sin embargo se recomienda hacer las aplicaciones dirigidas sobre las malezas evitando el contacto con el cultivo. Evitar los tratamientos post-emergentes de cultivos crecidos en suelos arenoso ligeros.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con compuestos de marcada reacción ácida o alcalina. **ATRAMET COMBI 50 SC** puede ser aplicado en mezcla con herbicidas hormonales como 2,4-D.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

